UDK 618.11-006.6-036.22(497.11)
COBISS.SR-ID 53949961

ИНЦИДЕНЦИЈА РАКА ЈАЈНИКА У НИШАВСКОМ ОКРУГУ

Биљана Коџић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Сажетак: **Увод:** Рак јајника је осмо најчешће малигно обољење жена у свету, чинећи 3,4% свих малигних тумора жена. Са највећим је леталитетом међу гинеколошким малигнитетима. Циљ рада био је да се анализира инциденција овог малигнома у Нишавском округу у периоду 1999-2018. године. **Материјал и метод:** Примењен је дескриптивни метод. Популациони регистар за рак Института за јавно здравље у Нишу био је извор података. Израчунате су сирове и стандардизоване стопе инциденције на 100.000 жена. Стандардизација је вршена директним методом. Израчунаван је линеарни тренд стопа инциденције. **Резултати:** У структури малигних болести жена рак јајника чини 5%. Просечна годишња стандардизована стопа инциденције износи 13,5. У посматраном двадесетогодишњем периоду, региструје се пораст линеарног тренда стопа инциденције. Највиша стандардизована стопа бележи се 2016. године (20,4), а најнижа 2002. године (10,1). Болест се не региструје испод петнаесте године живота, а најчешћа је у узрасту 70-74 године. Региструје се статистички значајан пораст тренда стандардизованих стопа инциденције са узрастом. Највиша стандардизована стопа инциденције бележи се у општини Сврљиг (18,5) а најнижа у општини Меровина (7,2). **Закључак:** Регистровање неповољног тренда инциденције рака јајника указује на недостатак адекватне примарне и секундарне превенције. Неопходно је ефикасно спроводити превентивне мере и едукацију жена у циљу редуковања фактора ризика и раног откривања болести.

Кључне речи: рак јајника, епидемиологија, инциденција

УВОД:

Рак јајника је осмо најчешће малигно обољење жена у свету, са 295 414 новооболелих и стандардизованом стопом инциденције 6,6/100000. Чини 3,4% свих малигних тумора жена [1]. Одсуство раних и специфичних симптома, неразвијеност техника скрининга и ране детекције иницијалних стадијума болести, као и изостанак категоризације високоризичних група, важни су разлози за дијагностиковање карцинома оваријума у одмаклим стадијумима, са петогодишњим преживљавањем од само 29%. Свега 15% се дијагностикује у I стадијуму (локализован тумор) са петогодишњим преживљавањем од 92% [2]. Ризик за оболевање током живота износи 1:75 жена. Болест је са највишим леталитетом међу гинеколошким малигнитетима [3].

У свету је присутан диспаритет инциденције овог малигнома. Највише стопе инциденције региструју се у земљама централне и источне Европе (10,7), северне Европе (8,8) у Полинезији (8,8), северној

Америци (8,1), југоисточној Азији (8,1) и јужној Европи (8,0). Најниже стопе бележе се у земљама средње Африке (4,7), на Карибима (4,6), у земљама јужне (4,9), источне (5,5) и западне (5,6) Африке, као и источне Азије (5,7), и северне Африке (5,7) [1].

Разумевање етиологије болести и идентификација фактора ризика, као и популација под повећаним ризиком од изузетног је значаја за превенцију карцинома јајника [4].

Циљ рада био је да се анализира инциденција овог малигнома у Нишавском округу у периоду 1999-2018.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД:

Примењен је дескриптивни метод. Популациони регистар за рак Института за јавно здравље у Нишу био је извор података. Израчунате су сирове и стандардизоване стопе инциденције на 100 000 жена. Стандардизација је вршена директним методом. Израчунаван је линеарни тренд стопа инциденције.

РЕЗУЛТАТИ:

У структури малигних болести жена рак јајника чини 5%. Просечна годишња стандардизована стопа инциденције износи 13,5. У посматраном двадесетогодишњем периоду, региструје се пораст линеарног тренда стопа инциденције. Највиша стандардизована стопа бележи се 2016. године (20,4), а најнижа 2002. године (10,1). Болест се не региструје испод петнаесте године живота, а најчешћа је у узрасту 70-74 године. Региструје се статистички значајан пораст тренда стандардизованих стопа инциденције са узрастом. Највиша стандардизована стопа инциденције бележи се у општини Сврљиг (18,5) а најнижа у општини Меровина (7,2).

ДИСКУСИЈА

Рак јајника се у Нишавском округу налази на седмом месту по учесталости карцинома у жена, после рака дојке, грлића материце, немеланомског рака коже, рака плућа, трахеје и бронха, утеруса и колона. У периоду 1999.-2013. године, рак оваријума је шести најчешћи карцином жена у централној Србији [5].

У посматраном периоду просечна годишња стандардизована стопа инциденције виша је у Нишавском округу у поређењу са стопом у централној Србији [5]. Према публикованим подацима [1], Србија бележи највишу стандардизовану стопу инциденције (16,6), док ниже стопе бележе Мађарска (13,2), Хрватска (12,1), Бугарска (10,9), Босна и Херцеговина (10,5), Румунија (10,4) и најнижу Јапан (9,5).

Слично нашим резултатима, бележи се узлазни тренд стопа инциденције у Србији [5]. Такође, инциденција са узрастом расте и највиша је у узрасту 40.-74. године [6]. Старење популације и висока преваленција фактора ризика могу бити значајни за објашњење пораста тренда инциденције рака јајника [4,5]. Од значаја за пораст инциденције болести су и промене у дијагностичким процедурама и класификацији, пре свега у развијеним земљама [7].

Разлике у стопама инциденције у општинама Нишавског округа могу указати на могућност да жене из градских средина, које су образованије, и којима је доступнија здравствена заштита, чешће посећују

гинеколога од жена из приградских и сеоских средина, сиромашнијих ресурса и нижег нивоа образовања [8,9]. Такође треба узети у обзир и значајну подрегистрацију новооболелих, нарочито у мањим општинама.

Рак јајника је мултикаузално обољење. Етиологија болести још увек није у потпуности разјашњена. Многобројни су фактори ризика који су предмет истраживања: демографски (узраст), репродуктивни (узраст менархе и менопаузе, узраст при порођају, трудноће), гинеколошки (пелвичне инфламације, ендометриоза), хормонални (хормонска контрацепција и терапија), генетски (породична историја, БРЦА мутације), навике (исхрана, физичка активност, гојазност, конзумирање алкохола, кафе и пушење цигарета), као и дојење и нижи социоекономски статус [10].

Генетски и фактори спољашње средине као и навике, спадају међу значајне факторе који могу да утичу на инциденцију болести [10].

Резултати истраживања указују да је позитивна породична анамнеза важан фактор; рођаци у првом степену сродства имају 3-7 пута већи ризик да оболе, нарочито у случају оболевања већег броја рођака и то у млађим годинама [11,12].

Истраживања су показала да многи фактори могу значајно да редукују ризик за настанак болести: трудноћа снижава ризик (по детету $RR=0.90$) [13], дуже дојење (снижава ризик 22%) [14], и употреба оралних контрацептива (ризик опада за 20% на сваких 5 година коришћења, перзистирајући више од 30 година после прекида коришћења) [15,16].

Такође, студије указују да неки фактори могу да утичу на повећање ризика за настанак болести: пушење цигарета (6%) [17], гојазност (28%) [18], употреба хормонске терапије (37%) [19], као и конзумирање црвеног mesa и месних прерађевина (19%) [20].

Запажено је да миграција жена из земаља са ниском инциденцијом у земље са високом инциденцијом, повећава ризик за настанак болести, указујући на значај негенетских фактора ризика [21].

ЗАКЉУЧАК:

Регистровање неповољног тренда инциденције рака јајника указује на недостатак адекватне примарне и секундарне превенције. Неопходно је ефикасно спроводити превентивне мере и едукацију жена у циљу редуковања фактора ризика и раног откривања болести. Крुцијални значај у превенцији болести има

модификација фактора ризика на које може да се утиче, са усвајањем здравих стилова живота и елиминацијом штетних навика.

ЗАХВАЛНИЦА

Аутор се захваљује Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Број пројектног уговора: 451-03-9/2021-14/200113) за финансијску подршку

ЛИТЕРАТУРА:

1. Globocan 2020.
2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2013, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2013/, based on November 2015 SEER data submission, posted to the SEER website, April 2016.
3. Jayson GC, Kohn EC, Kitchen HC, Ledermann JA. Ovarian cancer. *Lancet* (London, England), 2014;384(9951):1376-88.
4. Zhang Y, Luo G, Li M, Guo P, Xiao Y, Ji H, et al. Global patterns and trends in ovarian cancer incidence: age, period and birth cohort analysis. *BMC Cancer* 2019;19:984.
5. Antonijevic A, Rancic N, Ilic M, Todorovic B, Stojanovic M, Stefanovic J. Incidence and mortality trends of ovarian cancer in central Serbia. *JBUON* 2017; 22(2):508-12.
6. Rahmani K, Moradi-Lakeh M, Mansori K, Bidokhti F, Asadi-Lari M. global inequalities in incidence and mortality of ovarian cancer and associated factors: an ecological study. *Alzheimers Park Res Ther* 2018;1:1001.
7. Bray F, Loos AH, Tognazzo S, La Vecchia C. Ovarian cancer in Europe: crosssectional trends in incidence and mortality in 28 countries, 1953-2000. *Int J Cancer* 2005;113(6):977-90.
8. Alberg AJ, Moorman PG, Crankshaw S, Wang F, Bandera EV, Barnholtz-Sloan JS, et al. Socioeconomic status in relation to the risk of ovarian cancer in African-American Women: a population-based case-control study. *Am J Epidemiol* 2016;184(4):274-83.
9. Praestegaard C, Kjaer SK, Nielsen TS, et al. The association between socioeconomic status and tumour stage at diagnosis of ovarian cancer: A pooled analysis of 18 case-control studies. *Cancer Epidemiol* 2016;41:71-9.
10. Momenimovahed Z, Tiznobaik A, Taheri S, Salehiniya H. Ovarian cancer in the world: epidemiology and risk factors. *Int J Womens Health* 2019;11:287-99.
11. Ziogas A, Gildea M, Cohen P, Bringman D, Taylor TH, Seminara D, et al. Cancer risk estimates for family members of a population-based family registry for breast and ovarian cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2000; 9: 103-11.
12. Negri E, Pelucchi C, Franceschi S, Montella M, Conti E, Dal Maso L, et al. Family history of cancer and risk of ovarian cancer. *Eur J Cancer.* 2003; 39: 505-10.
13. Wentzensen N, Poole EM, Trabert B, White E, Arslan AA, Patel AV, Setiawan VW, Visvanathan K, Weiderpass E, Adami HO, et al. Ovarian Cancer risk factors by histologic subtype: an analysis from the ovarian Cancer cohort consortium. *J Clin Oncol.* 2016;34(24):2888-98.
14. Jordan SJ, Siskind V, Green AC, Whiteman DC, Webb PM. Breastfeeding and risk of epithelial ovarian cancer. *Cancer Causes Control.* 2010;21(1):109-116.
15. Cibula D, Gompel A, Mueck AO, La Vecchia C, Hannaford PC, Skouby SO, Zikan M, Dusek L. Hormonal contraception and risk of cancer. *Hum Reprod Update.* 2010;16(6):631-50.
16. Beral V, Doll R, Hermon C, Peto R, Reeves G. Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls. *Lancet.* 2008;371(9609):303-14.
17. Beral V, Gaitskell K, Hermon C, Moser K, Reeves G, Peto R. Ovarian cancer and smoking: individual participant meta-analysis including 28,114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies. *Lancet Oncol.* 2012;13(9):946-56.
18. Liu Z, Zhang TT, Zhao JJ, Qi SF, Du P, Liu DW, Tian QB. The association between overweight, obesity and ovarian cancer: a meta-analysis. *Jpn J Clin Oncol.* 2015;45(12):1107-15.
19. Beral V, Gaitskell K, Hermon C, Moser K, Reeves G, Peto R. Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies. *Lancet.* 2015;385(9980):1835-42.
20. Wang HF, Yao AL, Sun YY, Zhang AH. Empirically derived dietary patterns and ovarian cancer risk: a meta-analysis. *Eur J Cancer Prev.* 2018;27(5):493-501.
21. Kliever EV, Smith KR. Ovarian cancer mortality among immigrants in Australia and Canada. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 1995; 4: 453-8.

INVENTION OF OVARIAN CANCER IN NIŠAV DISTRICT

Biljana Kocic

FACULTY OF MEDICINE IN NIS, INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIS

Summary : Introduction : Ovarian cancer is the eighth most common malignant disease in women in the world, accounting for 3.4% of all malignant tumors in women. It has the highest lethality among gynecological malignancies. The aim of this paper was to analyze the incidence of this malignancy in the Nisava district in the period 1999-2018. years. Material and method: Descriptive method applied. The population registry for cancer of the Institute of Public Health in Nis was the source of the data. Raw and standardized incidence rates per 100,000 women were calculated. Standardization was performed by the direct method. The linear trend of the incidence rate was calculated. Results: In the structure of malignant diseases in women, ovarian cancer accounts for 5%. The average annual standardized incidence rate is 13.5. In the observed twenty-year period, an increase in the linear trend of incidence rates is registered. The highest standardized rate was recorded in 2016 (20.4), and the lowest in 2002 (10.1). The disease is not registered under the age of fifteen, and is most common in the age group of 70-74. There is a statistically significant increase in the trend of standardized incidence rates with age. The highest standardized incidence rate is recorded in the municipality of Svrlijig (18.5) and the lowest in the municipality of Merošina (7.2). Conclusion: The registration of an unfavorable trend in the incidence of ovarian cancer indicates a lack of adequate primary and secondary prevention. It is necessary to effectively implement preventive measures and education of women in order to reduce risk factors and early detection of the disease.

Key words : ovarian cancer, epidemiology, incidence

INTRODUCTION:

Ovarian cancer is the eighth most common malignant disease in women in the world, with 295,414 new cases and a standardized incidence rate of 6.6 / 100,000. It accounts for 3.4% of all malignant tumors in women [1]. The absence of early and specific symptoms, underdeveloped screening techniques and early detection of initial stages of the disease, as well as the lack of categorization of high-risk groups, are important reasons for diagnosing advanced ovarian cancer, with a five-year survival of only 29%. Only 15% are diagnosed in stage I (localized tumor) with a five-year survival rate of 92% [2]. The risk of lifelong illness is 1:75 women. The disease has the highest lethality among gynecological malignancies [3].

There is a disparity in the incidence of this malignancy in the world. The highest incidence rates are in Central and Eastern Europe (10.7), Northern Europe (8.8) in Polynesia (8.8), North America (8.1), Southeast Asia (8.1) and Southern Europe. (8.0). The lowest rates are recorded in Central Africa (4.7), the Caribbean (4.6), South (4.9), East (5.5) and West (5.6) Afri-

ca, as well as East Asia. (5.7), and North Africa (5.7) [1].

Understanding the etiology of the disease and identifying risk factors, as well as the population at increased risk, is extremely important for the prevention of ovarian cancer [4]. The aim of this paper was to analyze the incidence of this malignancy in the Nisava district in the period 1999-2018.

MATERIAL AND METHOD:

A descriptive method was applied. The population registry for cancer of the Institute of Public Health in Nis was the source of the data. Raw and standardized incidence rates per 100,000 women were calculated. Standardization was performed by the direct method. The linear trend of the incidence rate was calculated.

RESULTS:

In the structure of malignant diseases in women, ovarian cancer accounts for 5%. The average annual standardized incidence rate is 13.5. In the observed twenty-year period, an

increase in the linear trend of incidence rates is registered. The highest standardized rate was recorded in 2016 (20.4), and the lowest in 2002 (10.1). The disease is not registered under the age of fifteen, and is most common in the age group of 70-74. There is a statistically significant increase in the trend of standardized incidence rates with age. The highest standardized incidence rate is recorded in the municipality of Svrlijig (18.5) and the lowest in the municipality of Merošina (7.2).

DISCUSSION

Ovarian cancer is the seventh most common cancer in women in the Nisava district, after breast cancer, cervical cancer, non-melanoma skin cancer, lung, trachea and bronchial cancer, uterus and colon cancer. In the period 1999-2013. Ovarian cancer is the sixth most common cancer in women in central Serbia [5].

In the observed period, the average annual standardized incidence rate is higher in the Nisava district compared to the rate in central Serbia [5]. According to published data [1], Serbia has the highest standardized incidence rate (16.6), while lower rates are recorded by Hungary (13.2), Croatia (12.1), Bulgaria (10.9), Bosnia and Herzegovina (10, 5), Romania (10.4) and the lowest Japan (9.5).

Similar to our results, there is an upward trend in incidence rates in Serbia [5]. Also, the incidence increases with age and is highest in the age of 40-74. years [6]. Population aging and high prevalence of risk factors may be significant in explaining the increasing trend in ovarian cancer incidence [4,5]. Changes in diagnostic procedures and classification are also important for the increase in the incidence of the disease, primarily in developed countries [7].

Differences in incidence rates in Nisava District municipalities may indicate that women from urban areas who are more educated and have access to health care are more likely to visit a gynecologist than women from suburban and rural areas, poorer resources and lower levels of education [8,9]. Significant under-registration of new cases should also be taken into account, especially in smaller municipalities.

Ovarian cancer is a multicausal disease. The etiology of the disease has not yet been fully elucidated. There are many risk factors that are the subject of research: demographic (age), reproductive (age of menarche and menopause, age at birth, pregnancy), gynecological (pelvic

inflammation, endometriosis), hormonal (hormonal contraception and therapy), genetic (family history, BRCA mutations), habits (diet, physical activity, obesity, alcohol consumption, coffee and cigarette smoking), as well as breastfeeding and lower socioeconomic status [10].

Genetic and environmental factors, as well as habits, are among the important factors that can influence the incidence of the disease [10].

The results of the research indicate that a positive family history is an important factor; relatives in the first degree of kinship have a 3-7 times higher risk of getting sick, especially in the case of a larger number of relatives at a younger age [11,12].

Studies have shown that many factors can significantly reduce the risk of developing the disease: pregnancy reduces the risk (per child RR = 0.90) [13], longer breastfeeding (reduces the risk by 22%) [14], and the use of oral contraceptives decreases by 20 % every 5 years of use, persisting for more than 30 years after cessation of use) [15,16].

Also, studies indicate that some factors may increase the risk of developing the disease: cigarette smoking (6%) [17], obesity (28%) [18], use of hormone therapy (37%) [19], as well as consumption red meat and meat products (19%) [20].

It has been observed that the migration of women from low-incidence countries to high-incidence countries increases the risk of developing the disease, indicating the importance of non-genetic risk factors [21].

CONCLUSION:

The registration of an unfavorable trend in the incidence of ovarian cancer indicates a lack of adequate primary and secondary prevention. It is necessary to effectively implement preventive measures and education of women in order to reduce risk factors and early detection of the disease. Modification of risk factors that can be influenced, with the adoption of healthy lifestyles and elimination of harmful habits, is crucial in disease prevention.

THANK-YOU NOTE

The author thanks the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (Project Contract Number: 451-03-9 / 2021-14 / 200113) for financial support

LITERATURE:

1. Globocan 2020.
2. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2013, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2013/, based on November 2015 SEER data submission, posted to the SEER website, April 2016.
3. Jayson GC, Kohn EC, Kitchener HC, Ledermann JA. Ovarian cancer. *Lancet* (London, England), 2014;384(9951):1376-88.
4. Zhang Y, Luo G, Li M, Guo P, Xiao Y, Ji H, et al. Global patterns and trends in ovarian cancer incidence: age, period and birth cohort analysis. *BMC Cancer* 2019;19:984.
5. Antonijevic A, Rancic N, Ilic M, Todorovic B, Stojanovic M, Stefanovic J. Incidence and mortality trends of ovarian cancer in central Serbia. *JBUON* 2017; 22(2):508-12.
6. Rahmani K, Moradi-Lakeh M, Mansori K, Bidokhti F, Asadi-Lari M. global inequalities in incidence and mortality of ovarian cancer and associated factors: an ecological study. *Alzheimers Park Res Ther* 2018;1:1001.
7. Bray F, Loos AH, Tognazzo S, La Vecchia C. Ovarian cancer in Europe: crosssectional trends in incidence and mortality in 28 countries, 1953-2000. *Int J Cancer* 2005;113(6):977-90.
8. Alberg AJ, Moorman PG, Crankshaw S, Wang F, Bandera EV, Barnholtz-Sloan JS, et al. Socioeconomic status in relation to the risk of ovarian cancer in African-American Women: a population-based case-control study. *Am J Epidemiol* 2016;184(4):274-83.
9. Praestegaard C, Kjaer SK, Nielsen TS, et al. The association between socioeconomic status and tumour stage at diagnosis of ovarian cancer: A pooled analysis of 18 case-control studies. *Cancer Epidemiol* 2016;41:71-9.
10. Momenimovahed Z, Tiznobaik A, Taheri S, Salehiniya H. Ovarian cancer in the world: epidemiology and risk factors. *Int J Womens Health* 2019;11:287-99.
11. Ziogas A, Gildea M, Cohen P, Bringman D, Taylor TH, Seminara D, et al. Cancer risk estimates for family members of a population-based family registry for breast and ovarian cancer. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2000; 9: 103-11.
12. Negri E, Pelucchi C, Franceschi S, Montella M, Conti E, Dal Maso L, et al. Family history of cancer and risk of ovarian cancer. *Eur J Cancer.* 2003; 39: 505-10.
13. Wentzensen N, Poole EM, Trabert B, White E, Arslan AA, Patel AV, Setiawan VW, Visvanathan K, Weiderpass E, Adami HO, et al. Ovarian Cancer risk factors by histologic subtype: an analysis from the ovarian Cancer cohort consortium. *J Clin Oncol.* 2016;34(24):2888-98.
14. Jordan SJ, Siskind V, Green AC, Whiteman DC, Webb PM. Breastfeeding and risk of epithelial ovarian cancer. *Cancer Causes Control.* 2010;21(1):109-116.
15. Cibula D, Gompel A, Mueck AO, La Vecchia C, Hannaford PC, Skouby SO, Zikan M, Dusek L. Hormonal contraception and risk of cancer. *Hum Reprod Update.* 2010;16(6):631-50.
16. Beral V, Doll R, Hermon C, Peto R, Reeves G. Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls. *Lancet.* 2008;371(9609):303-14.
17. Beral V, Gaitskell K, Hermon C, Moser K, Reeves G, Peto R. Ovarian cancer and smoking: individual participant meta-analysis including 28,114 women with ovarian cancer from 51 epidemiological studies. *Lancet Oncol.* 2012;13(9):946-56.
18. Liu Z, Zhang TT, Zhao JJ, Qi SF, Du P, Liu DW, Tian QB. The association between overweight, obesity and ovarian cancer: a meta-analysis. *Jpn J Clin Oncol.* 2015;45(12):1107-15.
19. Beral V, Gaitskell K, Hermon C, Moser K, Reeves G, Peto R. Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies. *Lancet.* 2015;385(9980):1835-42.
20. Wang HF, Yao AL, Sun YY, Zhang AH. Empirically derived dietary patterns and ovarian cancer risk: a meta-analysis. *Eur J Cancer Prev.* 2018;27(5):493-501.
21. Kliewer EV, Smith KR. Ovarian cancer mortality among immigrants in Australia and Canada. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 1995; 4: 453-8.