¹Средња машинска школа, Приједор, Република Српска, БиХ

²Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево БиХ

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА И АТЛЕТИЧАРА-ЈУНИОРА У ПОЈЕДИНИМ МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА

Сажетак

Моторичке способности су незаобилазан сегмент антрополошког простора човјека и често су предмет научних истраживања. Обзиром на њихову сложену структуру врло често у истраживањима овог сегмента користе се различити приступи у дефинисању модела који ће послужити као основа за одабир и дефинисање манифестних варијабли. Најчешће се ради о феноменолошком приступу али нису ријетка истраживања која су базирана на функционалном моделу моторичких способности. У раду је анализиран простор моторичких способности популације ученика и атлетичара, јуниорског узраста са циљем утврђивања разлика у простору механизма централне регулације. Истраживањем је обухваћено 90 ученика који су укључени у различите спортске клубове и 90 атлетичара из четири атлетска клуба. Измјерено је 12 манифестних моторичких варијабли из простора механизма централне регулације. У анализи података, примјеном т-теста и каноничке дискриминативне анализе добијени су резултати који статистички значајно ($p < 0.01$) објашњавају разлике међу испитаницима. У седам варијабли ученици су остварили бољи резултат, а у четири варијабле је та разлика статистички значајна. Једино варијабле МИСП, МСПА, МСПОО, МФЛА из простора синергијске регулације и тонуса и варијабла МКОП из простора структурирања кретања нису оствариле статистички значајне разлике. Атлетичари су били бољи у тестовима флексибилности МДПК, МСРАС који су врло значајни у тркачким и скакачким дисциплинама.

Кључне ријечи: КООРДИНАЦИЈА / ФЛЕКСИБИЛНОСТ / РАВНОТЕЖА / ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

УВОД

Атлетика обухвата тркачке, бацачке, скакачке и ходачке дисциплине које се одликују моторичким кретањима и успјешно се могу примјењивати у току образовног процеса или кроз друге облике вјежбања, помоћу којих се значајно утиче на подизање опште психофизичке способности појединца. У било којем аспект спорта, па тако и атлетског спорта неопходно је познавање одређених карактеристика које одговарају појединим узрастима, а под утицајем

су ендогених или егзогених фактора. Бројна су истраживања која проучавају одређене сегменте антрополошког простора у карактеристичним узрастним периодима (млађи, средњи, старији школски узраст). Нека су оријентисана на млађи и средњи школски узраст проучавајући моторички статус дјете или младих спортиста (Анастасовски, 1981; Деспот, и Вискић-Шталец, 1983; Кукољ, Бокан, Копривица и Угарковић, 2001; Братић, Ђурашковић, и Ранђеловић, 2001; Breslauer, Delija,

i Mesarić, 2006; Павловић, Марковић, Бранковић, и Коцић, 2008; Cools, Christiane & Andries 2011; Vandorpe et al., 2012; Fransen et al., 2012). Врло често се као проблем истраживања дефинишу разлике у погледу морфолошких и моторичких димензија различитих популација исте старосне доби (Silva et al., 2012). Некада се ради о утврђивању разлика у спортским играма (Deliја, Šimenc, i Vuleta, 1995; Бојић, Коцић, и Миленковић, 2007; Prahović i Protić, 2007; Gabbett, Jenkins, & Abernethy, 2011) у моторичком простору, а нека су истраживања базирана на проучавању морфолошких димензија између спортиста и ученика (Trent, 1996; Breslau et al., 2006; Пелемиш, и Стевић, 2009; Kos, Sitar, i Andrović, 2010, Lepers, & Stapley, 2010). Интереси за оваква истраживања се темеље на сазнањима постојања могућих разлика уколико су одређене групе ангажоване у одређеном виду физичке активности у односу на групе које то нису, или унутар истог спорта, дисциплине када је у питању провођење тренажног процеса и ефеката тог процеса на могуће модификације субјекта. Врло је важно правилно дозирање и извођење физичке активности у условима када се млад организам налази у фази раста и развоја (Михајловић, 1996). Тада долази до акцелерације, прије свега локомоторног апарата и других система у организму (мишићни, кардиоваскуларни, респираторни) на бази чијих могућности се темељи одређени тренажни процес како не би дошло до могућих нежељених последица опасних по здравље (Михајловић, 1996; Тончев, и Михајловић, 1999; Павловић, 2010, Kazemi, 2012). Важан сегмент антрополошког простора чине моторичке способности на основу којих се добијају информације о моторичком функционисању човјека и као такве имају врло важну улогу у постизању спортског резултата. У анализи моторичких способности врло често се манифестне варијабле дефинишу по функционалном моделу (подразумјева промјене у ЦНС-у у току извођења кретања), а не по феноменолошком моделу (подразумјева начин извођења моторичког задатка). У оквиру функционалног модела (Стојиљковић, 2003), одређене способности из простора централне регулације кретања имају средњу (флексибилност) до високу генетску компоненту (равнотежа, координација). Учинак тренинга на побољшању резултата ових способности је врло мали, односно нешто је већи кад је

у питању флексибилност (Стојановић, Костић, и Ахметовић, 2006). Истраживања која су до сада вршена, а посебно новијег датума (Бојић и сар., 2007; Пелемиш, и Стевић, 2009; Cools et al., 2011; Kazemi, 2012) баве се човјеком као биопсихо-социјалним бићем и његовом могућношћу трансформације из једног облика у други путем усмјереног физичког вјежбања, различитим модификацијама тренажног рада или разликама између одређених популација.

Проблем истраживања су разлике између ученика и атлетичара у простору моторичких способности (варијабле централне регулације). Циљ истраживања јесте да се испитају евентуалне постојеће разлике између ученика и атлетичара у простору дефинисаних моторичких способности.

МЕТОД

Узорак испитаника

Узорак испитаника је обухватио популацију атлетичара јуниора атлетских клубова: Приједор, Борац (Бања Лука), Добој, Прњавор и популацију ученика средње Машинске школе из Приједора, узраста $15 \pm 0,5$ година. Укупно је обухваћено 90 атлетичара тркача и скакача (просјечне висине $173,37 \pm 8,94$ cm, тјелесне масе $60,21 \pm 10,46$ kg и БМИ $20,13 \pm 2,34$ kg/m²) из поменутих клубова који више од једне године тренирају атлетику и 90 ученика (просјечне висине $172,82 \pm 9,01$ cm, тјелесне масе $60,76 \pm 12,06$ kg и БМИ $20,59 \pm 3,23$ kg/m²) који такође више од једне године тренирају неки од спортова (фудбал 23, кошарка 18, рукомет 14, одбојка 19, бокс 2, карате 8, џудо 6). Сви испитаници су дали сагласност и добровољно учествовали у истраживању.

Узорак варијабли

За потребе овог истраживања утврђен је узорак од 15 варијабли. За процјену морфолошког статуса мјерене су три варијабле: висина тијела -АВИС, маса тијела-АМАС, Body Mass Index-БМИ (према Heyward, & Stolarczyk, 1996). За процјену моторичких способности (механизам централне регулације кретања) примјењен је скуп варијабли узет из истраживања Курелић и сар. (1975), Иванић и Иванић, (1999):

**За процјену координације кретања
примјењени су тестови:**

1. вођење лопте око сталака (МВЛС),
2. окретност у зраку (МОЗ),
3. вођење лопте око сталака ногом (МВЛСН),
4. координација са палицом (МКОП);

**За процјену флексибилности примјењени
су тестови:**

1. дубоки претклон на клупици (МДПК),
2. искрет палицом (МИСП),
3. чеона шпага (МШПА),
4. претклон у сиједу разножно (МРАС)

**За процјену равнотеже примјењени су
тестови:**

1. стајање на једној нози уздужно на греди отворених очију (МСУОО),
2. стајање на једној нози попречно на греди отворених очију (МСПОО),
3. стајање на једној нози попречно на греди затворених очију (МСПЗО),
4. фламинго (МФЛА).

Обрада података

Сва мјерења су извршена у првом полугодшту школске 2011/12 године. Да би се добили релевантни резултати на бази којих су добијени одговори, примјењене су основне статистичке процедуре, а у погледу утврђивања разлика извршена је анализа примјеном Т-теста за велике независне узорке на униваријантном нивоу и каноничка дискриминативна анализа на мултиваријантном нивоу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У Табели 1 налазе се основни статистички параметри моторичких способности и морфолошких димензија истраживаног узорка ученика и атлетичара, као и резултати т-теста. За сваку варијаблу израчунати су релевантни централни и дисперзиони параметри као и мјере варијабилности.

Табела 1. Средње вредности (АС), стандардне давијације (СД), минималне (Мин) и максималне (Макс) вриједности ученика и атлетичара и резултати т-теста

Варијабле	Ученици			Атлетичари			Т-тест
	АС±СД	Мин	Макс	АС±СД	Мин	Макс	т
МДПК (цм)	23.04±7.47	7.00	43.00	27.48±6.78	12.00	43.00	-4.40**
МИСП (цм)	44.36±10.25	8.00	63.00	45.78±11.02	20.00	80.00	-0.944
МШПА (цм)	162.86±19.94	79.00	195.00	167.40±20.51	110.00	209.00	-1.58
МШРАС (цм)	29.34±10.38	9.00	57.00	33.71±12.69	12.00	65.00	-2.66**
МВЛС (сец)	9.16±2.25	5.90	15.50	10.07±2.47	5.90	19.60	-2.72**
МОЗ (сец)	13.81±1.86	6.00	17.50	14.70±2.19	10.00	19.80	-3.08**
МВЛСН (сец)	13.87±5.15	7.40	33.30	15.55±3.56	9.80	29.30	-2.69**
МКОП (сец)	18.07±4.13	11.80	28.60	17.29±3.94	10.30	26.40	1.38
МСУОО (сец)	34.38±14.42	10.20	68.60	26.68±10.42	10.30	56.30	4.33**
МСПОО (сец)	19.05±10.83	2.80	45.80	17.04±7.81	3.60	44.80	1.51
МСПЗО (сец)	11.37±8.00	2.00	33.80	14.47±8.08	3.34	44.30	-2.72**
МФЛА (сец)	37.93±11.59	13.20	60.60	38.87±11.05	15.30	58.90	-0.584
АВИС (цм)	172.82±9.01	150.00	193.00	173.37±8.94	150.00	197.00	0.681
АМАС (кг)	60.76±12.06	45.00	90.00	60.21±10.46	46.00	92.00	0.744
БМИ (кг/м ²)	20.59±3.23	20.00	24.19	20.13±2.34	20.44	23.71	0.275

**Sig. (p<0.01)

Већина варијабли се налази у границама нормалне расподијеле. Ако се посматрају вриједности резултата код варијабли координације и равнотеже најмања су одступања у погледу дистрибуције резултата. Наравно, треба имати у виду и чињеницу да познат начин извођења конкретног моторичког задатка даје већу могућност његовог успјешнијег извођења. Познато је да се тренингом врло мало може утицати на координацију и равнотежу, док је флексибилност подложна већем тренажном утицају. На бази тих промјена може доћи до помјерања иницијалног стања поменутих способности. С тим у вези, њихови репрезенти (варијабле) се тако и односе и испољавају своје нумеричке вриједности, за разлику од оних на које се може у мањој мјери утицати. Овдје треба имати у виду чињеницу да се један број испитаника активно бави спортом, за разлику од оних који се не баве, па су и то лимитирајући фактори за евентуално другачију дистрибуцију варијабли, у позитивном смислу, зависно од типа моторичког задатка. Анализом вриједности резултата моторичких способности атлетичара (Табела 1) вриједности СД су у границама на бази којих се може оцјенити значајна осјетљивост тестова. У неким варијаблама координације присутна је јака мезокуртична и више лептокуртична дистрибуција резултата што је показатељ изражене хомогености узорка у тим варијаблама. Значајне разлике између бољих и слабијих резултата у моторичким тестовима атлетичара могу се објаснити претпоставком да су и у овом простору пресудну улогу одиграли фактори: бављење неком другом физичком активности (тренинг у спортским клубовима) којим се може повећати успјешност извођења тестова; претходно моторичко искуство; сазријевање ЦНС-а; те бројни егзогени и ендогени фактори. У сваком случају овдје је јасније изражена дистрибуција резултата у позитивном смјеру, што је посљедица усмјерене физичке активности, конкретно тренажног процеса атлетичара. Може се закључити да су испитаници у фази бурних психосоматских промјена, и да су код узорка атлетичара моторичке способности биле подложане одређеним модификацијама и трансформацијама у позитивном смјеру, а код ученика у нешто мањем обиму. Скоро идентична ситуација је у морфолошком простору гдје су тестиране три варијабле (телесна висина, телесна маса, БМИ)

показале приближно исте нумеричке средње вриједности ученика и атлетичара, тако да је то показатељ знатне хомогености узорка у погледу морфолошких димензија. Произилази да се на основу показатеља ових централних и дисперзионих статистичких параметара могу предвидјети и промјене и разлике на мултиваријантном нивоу, њихова јачина и поузданост.

Анализом разлика аритметичких средина у варијаблама флексибилности (Табела 1) уочавају се статистички значајне разлике између ученика и атлетичара у 50% мјерених тестова. Те разлике су у корист узорка атлетичара (у случају три варијабле) и једна у корист ученика (МИСП). Наиме, ради се о варијаблама дубоки претклон (МДПК) и сједећи претклон (МСРАС) у којем су атлетичари остварили бољи резултат и тиме омогућили разлику аритметичких средина које су значајне. Преостале двије варијабле су биполарне, што значи, једна је у корист ученика, искрет палицом (МИСП) а друга у корист атлетичара, шпагат (МШПА), али чије разлике нису значајне. Из овога произилази да су атлетичари више флексибилни у регији карлице и трупа, а ученици у регији руку и раменог појаса. Такође, флексибилност је, као моторичка способност, подложна промјенама услед усмјереног тренажног процеса (Kurtz, 1994 према Стојиљковић, 2003) и има удјела у реализацији већине моторичких задатака (Агреж, 1975). Границе оптималне флексибилности је тешко прецизно одредити и оне примарно зависе од узраста, пола и спортске (тренажне) активности (Heimar i sar. 1997). С обзиром да је код тркачких и скакачких дисциплина важна флексибилност карлице, услед повећања дужине корака, дужине лета и покрета током лета резултати су можда и очекивани. Међутим, у другим спортским гранама (рукомету, кошарци, фудбалу, одбојци или плесовима и спортској и ритмичкој гимнастици) флексибилност је такође врло значајна због боље реализације конкретних моторичких задатка (вештина) и смањења могућности повређивања (Бојић и сар.2007).

У Табели 1 се могу уочити статистички значајане разлике аритметичких средина и стандардне девијације у три од четири варијабле којима је процјењивана координација ученика и атлетичара. Те разлике су са високим нивоом значајности у корист ученика који су остварили боље вријеме. То се прије свега односи на вођење лопте око ста-

лака (МВЛС), окретност у ваздуху (МОЗ), вођење лопте ногама око сталака (МВЛСН). Једино испитаници у варијабли координација палицом (МКОП) нису остварили статистички значајну разлику и једино је та разлика у корист атлетичара. Може се рећи да су ови резултати очекивани ако се има на уму чињеница да се ради о ученицима којима је у њиховим спортским гранама много важнија координација него у тркачким и скакачким дисциплинама. На једној страни су цикличне структуре трчања и скокови, а на другој спортске игре и други спортови који су ацикличне и циклично-ацикличне структуре кретања. Координација као моторичка способност, као и брзина, је високо генетски условљена преко 80% па је називају и моторичка интелигенција (Гајић, 1985; Кукољ, 1996; Нићин, 2000) а доминантна је у оним активностима гдје треба ријешити неке сложеније моторичке задатке у што краћем времену (Гајић, 1990). Такви задаци су управо у спортским играма у току неког напада или одбране или неким другим спортовима (спортска и ритмичка гимнастика, акробатика...).

Присутне су статистички значајне разлике аритметичких средина и у варијаблама равнотеже. У двије варијабле (стајање уздуж на клупи отворених очију – МСУОО и стајање попречно на клупи затворених очију) остварене су разлике, једна у корист ученика, а друга у корист атлетичара. У тесту фламинго атлетичари су били бољи али није статистички значајна разлика која је остварена. Овакав резултат је очекиван јер је претпоставка да ни једни ни други у току тренинга не поклањају довољно пажње овој моторичкој способности, с обзиром на природу активности којом се баве. Да је ријеч о гимнастици или неком другом спорту, гдје је равнотеже доминантна способност, резултати би били вјероватно бољи али у корист гимнастичара. Генерално се може закључити да су резултати обје популације изузетно слаби па би се могло сугерисати на њиховом порасту.

У односу на резултате униваријантне анализе, намеће се закључак да су се, од укупног броја манифестних варијабли (12), чак у седам оствариле статистички значајне разлике. Изражено у процентима то износи приближно 58% што висок процентуални однос. У већини варијабли (седам) ученици су били ти који су остварили бољи резултат, нарочито у оним варијаблама које

су доминантне и значајне у спортским играма (координација, равнотежа). У четири варијабле је та разлика статистички значајна. Једино варијабле МИСП, МСПА, МСПОО, МФЛА из простора синергијске регулације и тонуса и варијабла МКОП из простора структурирања кретања нису оствариле статистички значајне разлике. То је утолико значајније за праксу, ако се узме у обзир чињеница, да је међу ученицима велики број оних који су активно укључени у различите спортске клубове и непосредно у тренажни процес, и тиме показали супериорније резултате у односу на атлетичаре истог узраста. Атлетичари су били бољи у тестовима флексибилности, МДПК, МСРАС који су врло значајни у тркачким и скакачким дисциплинама.

На мултиваријантном нивоу примјеном каноничке дискриминативне анализе анализирање су разлике моторичких способности између ученика и атлетичара. У простору 12 моторичких варијабли, изолована је једна значајна дискриминативна функција дефинисаних варијабли ($P=0.84$). Овако висока повезаност варијабли показује у којој је корелацији скуп података моторичких способности, на основу којих је извршена дискриминативна анализа моторичког простора. Резултати дискриминативне јачине варијабли, односно коефицијент детерминације функције моторичких способности су изузетно високи (Вилк'с Ламбда=0.69), што указује да су разлике између ученика и атлетичара у простору енергетске регулације врло значајне ($p=0.001$).

Табела 2. Факторска структура дискриминативне функције

Варијабле	Корен 1	Коеф.
МДПК	-0.34	-0.18
МИСП	0.18	-0.16
МШПА	-0.15	-0.17
МШРАС	-0.29	-0.22
МВЛС	0.31	0.02
МОЗ	0.34	-0.20
МВЛСН	0.38	-0.08
МКОП	-0.19	-0.15
МСУОО	0.31	-0.10
МСПОО	0.21	0.14
МСПЗО	-0.29	-0.16
МФЛА	0.19	0.10

У Табели 2 дата је факторска структура дискриминативне функције, учешћа моторичких способности у њеном формирању. Од укупно 12 варијабли највећи допринос дискриминативној функцији су оствариле оне којима је дефинисана координација (МВЛСН, МОЗ, МВЛС), флексибилност (МДПК, МСРАС) и равнотежа (МСУОО, МСПОО, МСЗПО) са ниским нумеричким пројекцијама. Главни носилац јесте варијабла вођење лопте око сталака ногом (МВЛСН), окретност у зраку (МОЗ), вођење лопте сламом (МВЛС). Такође и варијабле равнотеже су имале значајан допринос у дискриминационој функцији (МСУОО), (МСПЗО), (МСПОО) као и двије варијабле флексибилности гдје су атлетичари постигли боље резултате (МДПК) и (МСРАС). Оно што је интересантно у овом случају јесте углавном позитиван предзнак свих варијабли централне регулације. Према позитивном предзнаку произилази да су ове варијабле код ученика директно утицале на дискриминацију у односу на атлетичаре, јер су у корелацији са позитивним положајем центроида популације ученика. Провјеравањем удаљености аритметичких средина група уочавају се довољно велике разлике, које су потврђене на основу Махалобисове дистанце (Табела 3). На основу изолованих варијабли које су одредили дискриминативну функцију моторичког простора ова би се функција могла дефинисати као функција *координације кретања*. Из вриједности предзанка центроида, који је негативног карактера код узорка атлетичара, може се објаснити њихова директна веза са варијаблама које их дискриминишу од узорка ученика, а то су све варијабле које имају негативну вриједност.

Табела 3. Центроиди и Махалобисова дистанца

	Махалобисова дистанца			Ф-вредности	
	Корен 1	G 1:1	G 2:2	G 2:2	
G_1:1	1.72	0.00	9.19	--	10.16
G_2:2	-1.72	14.72	0.00	15.10	--

Како би се провјерила значајност функције и оправданост резултата израчуната је Ф-вриједности. На основу ових показатеља може се закључити да је изолована дискриминативна функција статистички значајна, са релевантним

параметрима функције и да је ипак у већини моторичких способности различита, хетерогена.

Генерално посматрано потврђени су резултати из униваријантне анализе моторичких способности и на мултиваријантном нивоу. Разлике су у корист ученика у већини варијабли механизма централне регулације (структурирања кретања, синергијске регулације и мишићног тонуса), односно координацији, неким мјерама флексибилности и равнотеже, односно оним кретним структурама које имају више утицаја и значаја у спортским играма и неким другим ацикличним кретањима у односу на атлетске тркачке и скакачке дисциплине.

ЗАКЉУЧАК

Истраживање је спроведено на узорку 180 испитаника хронолошке доби 15 ± 0.5 година, са циљем утврђивања разлика између ученика и атлетичара јуниора у простору централне регулације. Анализом резултата разлика аритметичких средина тестираних мјера моторичког простора ученика и атлетичара показано је да постоји значајна разлика у скоро свим мјерама али је само у 7 случајева та разлика статистички значајна, што износи 58% разлика од укупног броја мјерених варијабли. Те разлике су забиљежене у скоро свим варијаблама координације у корист ученика у односу на атлетичаре, док су у мјерама флексибилности и равнотеже те разлике квантитативно скоро идентичне. Ученици су генерално имали боље резултате из простора способности у оквиру механизма структурирања кретања, док су у флексибилности атлетичари остварили бољи резултат нарочито у оним варијаблама које су доминантне и значајне у атлетским тркачким и скакачким дисциплинама. У простору равнотеже двије варијабле су оствариле статистички значајне разлике, једна у корист атлетичара (МСПЗО), а једна у корист ученика (МСУОО). Произилази да су ученици и атлетичари сличних способности у простору механизма синергијске регулације и регулације мишићног тонуса.

Преостале четири варијабле из простора флексибилности и равнотеже су оствариле разлике у корист атлетичара или ученика али

нису статистички значајне. Овај резултат и не изненађује јер ученици тренирају углавном спортске игре гдје координација има, вјероватно, већи значај у датој активности од неке тркачке или скакачке дисциплине. Такође, резултати каноничке дискриминативне анализе у моторичком простору

су показали да постоји статистички значајна разлика и да је функција дефинисана мјерама координације у корист ученика односно мјерама флексибилности и равнотеже у корист и ученика и атлетичара, односно биполарно у оквиру једног простора.

ЛИТЕАРУРА

1. Агреж, Ф. (1975). Каноничке релације мјера флексибилности и простора осталих моторичких способности. *Кинезиологија*, 5(1-2), 113–123.
2. Анастасовски, А. (1981). Упоредна анализа антропометријских и моторичких димензија код ученика, спортиста и осталих. *Физичка култура*, 96–108.
3. Братић, М., Ђурашковић, Р., и Ранђеловић, Ј. (2001). Морфолошки и функционални статус школске деце и деце ђудиста. У Зборнику Н.Живановић (Ур.), *VIII међународни научни скуп ФИС Комуникације* Ниш (30–33). Ниш: ФФК.
4. Breslauer, N., Delija, K., i Mesarić, I. (2006). Kvantitativne razlike između skupina ispitanika u školskim atletskim varijablama. *Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa RH*, (84–87), Rovinj.
5. Бојић, И., Коцић, М., и Миленковић, Д. (2007). Разлике у неким моторичким способностима код врхунских кошаркаша и рукометаша. *XIII ФИС комуникације*. Зборник сажетака (стр.35). Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.
6. Vandorpe, B., Vandendriessche, J.B., Vaeyens, R., Pion, J., Lefevre, J., Renaat, M., Philippaerts, M.R., & Lenoir, M. (2012). The value of a non-sport-specific motor test battery in predicting performance in young female gymnasts. *Journal of Sports Sciences*, 30(5), 497–505.
7. Gabbett, T.J., Jenkins, D.G & Abernethy, B. (2011). Relationships between physiological, anthropometric, and skill qualities and playing performance in professional rugby league players. *Journal of Sports Science*, 29(15), 1655–1664.
8. Гајић, М. (1985). *Основи моторике човека*. Нови Сад: Факултет физичке културе.
9. Гајић, М. (1990). *Трансформација координације у зависности од програма активности*. Зборник радова, св.5. (13.23).
10. Деспот, А., и Вискић-Шталец, Н. (1983). Разлике међу дванаестогодишњим ученицима и ученицама у неким конативним, морфолошким и моторичким особинама. *Кинезиологија*, 15, 63–67.
11. Delija, K., Šimenc, Z., i Vuleta, D. (1995) Razlike u nekim općim i situacijskim testovima motoričkih sposobnosti rukometaša i nerukometaša. *Kineziologija*, 27(1), 57–61.
12. Иванић, С., и Иванић, В. (1999). *Предселекција критеријуми и норме за одређивање предиспозиција деце и омладине за врхунска спортска достигнућа*. Републички завод за спорт Београд.
13. Kazemi, M. (2012). Relationships between injury and success in elite Taekwondo athletes. *Journal of Sports Sciences*, 30(3), 277–283.
14. Kos, D., Sitar, A., i Andrović, M. (2010). Razlike između dvije skupine učenika srednje škole različite angažiranosti u sportu u motoričkim testovima agilnosti. *Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH*, (124–129), Rovinj.
15. Кукољ, М. (1996). *Општа антропомоторика*. Београд: Факултет физичке културе
16. Кукољ, М., Бокан, Б., Копривица, В., и Угарковић, Д. (2001). Међусобна повезаност моторичких способности ученика млађег школског узраста у периодима њихових значајних промена. Зборник радова „Фис-комуникације“ (70–78). Ниш: Факултет физичке културе

17. Курелић, Н., Момировић, К., Стојановић, М., Штурм, Ј., Радојевић, Д.Ј., и Вискић-Шталец, Н. (1975). *Структура и развој морфолошких и моторичких димензија омладине*. Београд: Научни институт факултета физичког васпитања Универзитета у Београду.
18. Lepers, R., & Stapley, J.P. (2010). Differences in gender and performance in off-road triathlon *Journal of Sports Science*, 28(14), 1555–1562.
19. Михајловић, И. (1996). Селекција и тренажни процес у спринту. Зборник радова *Вежбање и тренинг* (239–244). Београд: Факултет физичке културе.
20. Нићин, Ђ. (2000). *Општа антропомоторика*. Нови Сад: ФФК
21. Павловић, Р., Марковић, С., Бранковић, Н., и Коцић, Ј. (2008). Разлике моторичког статуса дјечака и дјевојчица предпубертетског узраста. *Физичка култура, (Скопље)* 36,(2), 202–204
22. Павловић Р. (2010). *Атлетика*. Универзитет Источно Сарајево: ФФВС.
23. Prahović, M., i Protić, J. (2007). Razlike u antropološkim obilježjima između četrnaestogodišnjih nogometaša, košarkaša, rukometaša i onih koji se ne bave sportom. Zbornik radova *16. ljetne škole kineziologa RH*, (470–476)
24. Пелемиш, М. и Стевић, Д. (2009). Утицај реализације програма наставе физичког васпитања на морфолошке и моторичке способности. *Спорт и Здравље*, 3(1), 117–124.
25. Радиновић, З. (2011). *Структуралне разлике између ученика и атлетичара јуниорског узраста*. (Магистарска теза). Источно Сарајево: Факултет физичког васпитања и спорта.
26. Silva, D.A., Benedetti, T.R., Ferrari, E.P., Meurer, S.T., Antes, D.L., Silva, A.M., Santos, D.A., Matias, C.N., Sardinha, L.B., Vieira, F., & Petroski, E.L. (2012). Anthropometric profiles of elite older triathletes in the Ironman Brazil compared with those of young Portuguese triathletes and older Brazilians. *Journal of Sports Sciences*, 5(14), 479–484.
27. Стојиљковић, С. (2003). *Основе опште антропомоторике*. Ниш: Студентски културни центар.
28. Стојановић, Т., Костић, Р., и Ахметовић, З. (2006). *Теорија и методика спортског тренинга*. Нови Сад: Факултет за спорт и туризам.
29. Тончев, И., и Михајловић, И. (1999). Развој издржљивости младих атлетичара тркача на средњим и дугим стазама. III симпозијум *Ефекти различитих модела наставе физичког васпитања на психосоматски статус деце и омладине*. Зборник сажетака (53).
30. Trent, P. (1996). Differences between male and female college lean sport athletes, nonlean sport athletes, and non athletes on behavioral and psychological indices of eating disorders. *Journal of Applied Sport Psychology*, 8(2), 218–230.
31. Franssen, J., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Vaeyens, R., Leonir, M., & Philippaerts, R.M. (2012). Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6-12 years specializing in one versus sampling more than one sport. *Journal of Sports Sciences*, 4(13), 379–386.
32. Heyward, H.V., & Stolarczyk, M.L. (1996). *Applied Body Composition Assessment*. Champaign: Human Kinetics.
33. Heimar, S. i Medved, R. (1997). Funkcionalna dijagnostika treniranosti sportaša. *Međunarodno savetovanje, Zbornika radova* (23–44). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
34. Cools, W., Christiane, M., & Andries, C. (2011). Fundamental movement skill performance of preschool children in relation to family. *Journal of Sports Sciences*, 29(7), 649–660.

Рад представља извод из магистарског рада “Структуралне разлике између ученика и атлетичара јуниорског узраста” одбрањен на Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву 09. марта 2012. године. Република Српска-БиХ

Примљен: 29.06.2012.
Прихваћен: 20.02.2013.

¹Secondary school of Mechanical Engineering, Prijedor, Republic of Srpska, BIH

²University of East Sarajevo, Faculty of Sport and Physical Education, East Sarajevo, Republic of Srpska, BIH

DIFFERENCES BETWEEN THE STUDENTS AND ATHLETES-JUNIORS IN CERTAIN MOTOR CAPABILITIES

Abstract

Motor skills are an essential segment of the anthropological premises of man and are often the subject of scientific research. Due to their complex structure is very often in studies of this segment have a different approach in defining a model that will serve as the basis for the selection and definition of manifest variables. Usually there is a phenomenological approach, but not rare studies that are based on a functional model of motor skills. This paper analyzes the area of motor skills of the population of students and athletes, youth ages with the aim of determining the difference in the space of the mechanism of central regulation. The study included 90 students who were involved in various sports teams and 90 athletes from four athletic club. Measured is 12 manifest variables from the space motor mechanism of central regulation. In analyzing the data, using t-test and canonical discriminant analysis were obtained statistically significant results ($p < 0.01$) that explain the differences among the respondents. The seven variables pupils have achieved a better result, and the four variables, the difference is statistically significant. The only variable MISP, MSPA, MSPOO, MFLA synergistic regulation of space and tone and variable room MKOP of structuring movements are not recorded statistically significant differences. Athletes have been better in tests of flexibility, MDPK, MSRAS which are very important in racing and high jump events.

Key words: COORDINATION / FLEXIBILITY / BALANCE / CENTRAL REGULATION.

INTRODUCTION

Athletics includes racing, throwing, jumping and walking disciplines characterized by motor movements and can be successfully applied in the educational process or through other forms of exercise, by which is made a significant impact on raising the general mental and physical abilities. In any aspect of sports, including athletics it is necessary to know certain characteristics that correspond to different ages, and are influenced by endogenous or exogenous factors. There are numerous studies which look at specific segments in the space of anthropological characteristic age periods (junior, intermediate and senior school age). Some are oriented to the younger and middle schoolers studying the motor status of chil-

dren and young athletes (Anastasovski, 1981; Despot, & Viskić-Štalec, 1983; Kukolj, Bokan, Koprivica, & Ugarković, 2001; Bratić, Đurašković, & Randelović, 2001; Bresauler, Delija, & Mesarić, 2006; Pavlović, Marković, Branković, & Kocić, 2008; Cools, Christiane, & Andries 2011; Vandorpe at al., 2012; Fransen at al., 2012). Very often as a research problem are defined the differences in morphological and motor dimensions of different populations of the same age (Silva et al., 2012). Sometimes it comes to determining the differences in sports performance (Delija, Šimenc, & Vuleta, 1995; Bojić, Kocić, & Milenković, 2007; Prahović, & Protić, 2007; Gabbett, Jenkins, & Abernethy, 2011) in motor space, and some research

based on the study of morphological dimensions between athletes and students (Trent, 1996; Bresauler et al. 2006; Pelemiš, & Stević, 2009; Kos, Sitar, & Andrović, 2010, Lepers, & Stapley, 2010). Interests for this study are based on the knowledge of existence of possible differences, if certain groups are engaged in a form of physical activity in relation to the groups that are not, or within the same sport discipline when it comes to implementing the training process and the effects of this process on possible modifications of the subject. It is very important the proper dosage and performing of physical activity at a time when the young organism is in the process of growth and development (Mihajlović, 1996). When it comes to acceleration, primarily locomotor system and other systems in the body (muscle, cardiovascular, respiratory) on the basis of whose features is determined a certain based training process in order to avoid possible adverse consequences hazardous to health (Mihajlović, 1996; Tončev, & Mihajlović, 1999; Pavlović, 2010, Kazemi, 2012).

An important segment of the human area consists of motor capabilities on the basis of which we get information about the motor functioning of the human and as such ones have a very important role in achieving sporting results. In the analysis of motor skills, manifest variables are often defined by the functional model (includes changes in the CNS during execution of movement) rather than by phenomenological model (includes the method of execution motor task). In the functional model (Stojiljkovic, 2003), the certain capabilities from central control regions of movement has a mean (flexibility) to a high genetic component (balance, coordination).

The effects of training in order to improve the results of these abilities are so small or slightly higher when it comes to flexibility (Stojanovic, Kostic, & Ahmetovic, 2006). The studies that have been done so far, especially the more recent ones (Bojic et al., 2007; Pelemiš, & Stević, 2009, Cools et al. 2011; Kazemi, 2012) are dealing with the person as a bio-psycho-social being and its ability of transformation from one form to another through a directed physical exercise, various modifications of training work or differences between certain populations.

Problem of the studies are the differences between the students and athletes in the area of motor skills (central control variables). The aim of this research is to examine any existing differences be-

tween students and athletes in the space of defined motor skills.

METHOD

The sample

The sample population consisted of junior athletes from athletic clubs: Prijedor, Borac (Banja Luka), Doboj, Prnjavor and the population of secondary school of mechanical engineering in Prijedor, age 15 years $\pm$ 0.5 years. A total of 90 runners and jumping athletes (mean height 173.37 ± 8.94 cm, weight 60.21 ± 10.46 kg and BMI 20.13 ± 2.34 kg/m²) from these clubs that have more than one year of athletic training and 90 students (average height of 172.82 ± 9.01 cm, weight 60.76 ± 12.06 kg and BMI 20.59 ± 3.23 kg/m²), which also have more than one year of training some of the sports (23 football, basketball 18, 14 handball, volleyball 19, box 2, karate 8, judo 6. All subjects gave consent and voluntarily participated in the survey.

Sample of variables

For the purposes of this study a sample of 15 variables have been identified. To assess the status of morphology three variables were measured: body height-AVIS, AMAS-body weight, Body Mass Index-BMI (Heyward & Stolarczyk, 1996). For the assessment of motor skills (the mechanism of central control of movement) was applied a set of variables drawn from the research Kurelić et al., 1975, Ivanic, & Ivanic, 1999:

To assess the coordination of movement tests were applied:

1. keeping the ball around the stands (MVLS)
2. agility in the air (MOZ),
3. dribble around the leg stands (MVLSN)
4. coordination with the bat (MKOP);

To assess the flexibility the tests were applied:

1. deep reach the bench (MDPK)
2. flex rod (MISP)
3. lateral split (MŠPA),
4. forward bend while sitting feet apart (MRAS)

To assess the balance the tests were applied:

1. standing on one leg in longitudinal beam eyes open (MSUOO)
2. standing on one leg transversely to the beam with open eyes (MSPOO)
3. standing on one leg transverse to the beam with eyes closed (MSPZO)
4. flamingo (MFLA).

All measurements were performed in the first semester of school year 2011/12 year. In order to obtain relevant results based on which we received responses, we applied basic statistical parameters, and in terms of determining the differences the analysis has been conducted using t-test for independent samples of high-level univariate and canonical discriminant analysis on the multivariate level.

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1 contains the basic statistical parameters of motor abilities and morphological dimensions of the investigated sample of students and athletes, as well as the T-test results. For each variable, relevant central and dispersion parameters were calculated as well as measures of variability.

Table 1. Mean values, standard deviations (SD), minimum (Min) and maximum (Max) values of students and athletes, and the t-test

Variable	Pupils			Athletics			T-test
	Mean $\pm$ SD	Min	Max	Mean $\pm$ SD	Min	Max	T
MDPK	23.04 $\pm$ 7.47	7.00	43.00	27.48 $\pm$ 6.78	12.00	43.00	-4.40**
MISP	44.36 $\pm$ 10.25	8.00	63.00	45.78 $\pm$ 11.02	20.00	80.00	-0.944
MŠPA	162.86 $\pm$ 19.94	79.00	195.00	167.40 $\pm$ 20.51	110.00	209.00	-1.58
MŠRAS	29.34 $\pm$ 10.38	9.00	57.00	33.71 $\pm$ 12.69	12.00	65.00	-2.66**
MVLS	9.16 $\pm$ 2.25	5.90	15.50	10.07 $\pm$ 2.47	5.90	19.60	-2.72**
MOZ	13.81 $\pm$ 1.86	6.00	17.50	14.70 $\pm$ 2.19	10.00	19.80	-3.08**
MVLSN	13.87 $\pm$ 5.15	7.40	33.30	15.55 $\pm$ 3.56	9.80	29.30	-2.69**
MKOP	18.07 $\pm$ 4.13	11.80	28.60	17.29 $\pm$ 3.94	10.30	26.40	1.38
MSUOO	34.38 $\pm$ 14.42	10.20	68.60	26.68 $\pm$ 10.42	10.30	56.30	4.33**
MSPOO	19.05 $\pm$ 10.83	2.80	45.80	17.04 $\pm$ 7.81	3.60	44.80	1.51
MSPZO	11.37 $\pm$ 8.00	2.00	33.80	14.47 $\pm$ 8.08	3.34	44.30	-2.72**
MFLA	37.93 $\pm$ 11.59	13.20	60.60	38.87 $\pm$ 11.05	15.30	58.90	-0.584
AVIS (cm)	172.82 $\pm$ 9.01	150.00	193.00	173.37 $\pm$ 8.94	150.00	197.00	0.681
AMAS (kg)	60.76 $\pm$ 12.06	45.00	90.00	60.21 $\pm$ 10.46	46.00	92.00	0.744
BMI (kg/m²)	20.59 $\pm$ 3.23	20.00	24.19	20.13 $\pm$ 2.34	20.44	23.71	0.275

**Sig. (p<0.01)

Most of the variables are within the boundaries of normal distribution. If we look at the result values of the variables of coordination and balance, the smallest deviation is in term of the distribution of results. Of course, one should bear in mind the fact that the familiar way of a specific motor task implementa-

tion gives more of its successful implementation. It is known that training has a small effect on coordination and balance, but on the other hand it has a bigger effect on the flexibility. The basis of these changes may cause a shift of the initial state of these capabilities. In this regard, their embodiments (variables) are

related on that way and they express their numerical values, as opposed to those that may be affected to a smaller extent. One should bear in mind the fact that a number of respondents are actively engaged in sports, as opposed to those who are not involved, and so these are the limiting factors for the eventual distribution of different variables, depending on the type of motor tasks. Through the analysis of the results of the motor capabilities among the athletes (Table 1), SD values are within the boundaries on the basis of which we can evaluate significant test sensitivity. In some variables of coordination, mezokurtic or leptokurtic distribution of results is presented, which shows the homogeneity of the sample expressed in these variables. Significant differences between better and weaker performances in motor tests of the athletes can be explained by assuming that these factors played a decisive role: dealing with other physical activity (training in sport clubs), which can increase the performance of tests, pre-motor experience, maturity of CNS, and a number of exogenous and endogenous factors. In any case, here is the distribution of the results more clearly expressed in the positive direction as a result of targeted physical activity, particularly with the training process among the athletes. It can be concluded that the respondents are in the turbulent phase of psychosomatic changes, and that among the sample of the athletes, motor abilities were accessible to certain modifications and transformations in a positive direction, and among the students these abilities were accessible to a lesser extent. Situation is almost identical in morphological area where three variables (height, weight, BMI) were tested, which showed almost the same numerical mean values among the students and athletes, that is the representation of homogeneity of the sample dealing with morphological dimensions. It follows that on the basis of these indicators of central and dispersion of statistic parameters, we can predict the changes and differences in multivariate level, its strength and reliability.

Through the analysis of differences in mean values of the variables of flexibility (Table 1) we can notice statistically significant differences between the students and athletes in 50% of measured tests. These differences were for the benefit of the athlete's sample (in the case of three variables) and one was for the benefit of students (MISP). In variables deep forward bend (MDPK) and sitting forward bend (MS-

RAS) athletes achieved better results, which created significant differences dealing with mean values. The remaining two variables are bipolar, that is, one is in favor of the students, flex rod (MISP) and the other is in favor of the athlete, string (MSPA), but those differences are not significant. This suggests that athletes are more flexible in the region of the pelvis and trunk, and students are more flexible in the region of arms and shoulders. Also, the flexibility as a motor ability is accessible to change due to focused training process (Kurtz, 1994 by Stojiljkovic, 2003) and it participates in the implementation of most motor tasks (Agrez, 1975). Limits of optimal flexibility are difficult to determine precisely. They primarily depend on age, sex, and sports (trainers) activities (Heimar et al., 1997). Flexibility of pelvic is important with the race and jump discipline and the results are maybe expected due to the increase of length of stride and the length of the flight and movement during the flight. Flexibility is also very important in other branches of sports (handball, basketball, football, volleyball, dance and sports or rhythmic gymnastics) for better implementation of the specific motor tasks (skills) and in order to reduce the possibilities of injuries (Bojic et al., 2007).

From Table 1 we can notice statistically significant differences of means, standard deviations, in three of the four variables that were evaluated coordination of students and athletes. This relates primarily to ball dribbling around the stands (MVLS), agility in the air (MOZ), dribbling around the stands with legs (MVLSN). Only in the variable coordination of bat (MKOP) participants did not achieve statistical significance, and only that difference is in favor of athletes. It can be said that these results are expected if we bear in mind the fact that these are students whom coordination is more important in their sport branches than in racing or jumping disciplines. On one side are the cyclic structure of running and jumping, and on the other side are sports games and other sports that have acyclic and cyclic-acyclic structures of the movements. Coordination as motor skill, as well as speed, is highly genetically conditioned over 80% so it is called motor intelligence (Gajic, 1985; Weeds, 1996; Nićin, 2000) and is dominant in those activities where we need to solve some complex motor tasks in which shorter time (Gajic, 1990). Such tasks are just in sports games during an attack, defense, or in some other sports (sports, rhythmic gymnastics, acrobatics...).

Statistically significant differences of means are presented in variables of balance. In two variables (standing on the bench along with open eyes - MSUOO and standing cross on the bench with eyes closed) differences were visible, one in favor of the student, and the other in favor of the athlete. In flamingo test athletes were better but statistically significant difference was not achieved. This result was expected because of the assumption that neither the ones nor the others pay enough attention to motor skill despite the nature of the activities they are involved. In gymnastics or in any other sport where the dominant balance ability, the results would probably have been better but for the benefit of the gymnast. Generally it can be concluded that the results of both populations are extremely weak and they should be improved.

Compared to the results of univariate analysis, the conclusion is that of the total number of manifest variables (12), statistically significant differences are achieved in seven variables. It is approximately 58% in terms of percentage. In most of the variables (seven) students were those who achieved a better result, especially in those variables that are dominant and important in sports performance (coordination, balance). In four variables that difference is statistically significant. Only the variables MISP, MSPA, MSPOO, MFLA from the space of synergistic regulation and tone and MKOP variables from the space of structuring movement did not achieve statistical significance. The fact that among the large number of students exist those who are actively involved in various sports clubs and directly in the training process is more important to practice. These students achieved more superior results compared to the athletes of the same age. Athletes were better in MDPK, MSRAS tests of flexibility which are very important in racing and jumping disciplines.

The differences in motor skills among the students and athletes were analyzed at the multivariate level using canonical discriminative analysis. In the space of 12 motor variables, an important function of defined variables ($R = 0.84$) was isolated. This high correlation indicates the correlation of motor abilities, on the basis of which the discriminative analysis of motor space was performed. The results of discriminative strength of variables and determination coefficient of motor abilities function are extremely high (Wilks' Lambda = 0.69) which indicates that the dif-

ferences between the students and athletes in the area of energetic regulation are very significant. ($p=0.001$)

Table 2. Factor structure of the discriminant function

Variable	Root 1	St.Coef.
MDPK	-0.34	-0.18
MISP	0.18	-0.16
MŠPA	-0.15	-0.17
MŠRAS	-0.29	-0.22
MVLS	0.31	0.02
MOZ	0.34	-0.20
MVLSN	0.38	-0.08
MKOP	-0.19	-0.15
MSUOO	0.31	-0.10
MSPOO	0.21	0.14
MSPZO	-0.29	-0.16
MFLA	0.19	0.10

In Table 2 the factor structure of the discriminative function is presented and participation of motor abilities in its formation. Among the total of 12 variables, the greatest contribution of discriminative function achieved those which defined coordination (MVLSN, MOZ, MVLS), flexibility (MDPK, MSRAS) and balance (MSUOO, MSPOO, MSZP) with low numerical projections. The main variable is dribbling ball around the stands with legs (MVLSN), agility in the air (MOZ) and slalom dribbling (MVLS). Also, the equilibrium variables had a significant contribution to the discriminative function (MSUOO), (MSPZO), (MSPOO) and the two variables of flexibility where athletes achieved better results (MDPK) and (MSRAS). A positive sign for all variables of central regulation is interesting. Positive signs indicate that these variables among students were directly discriminated in regard to athletes, because they are in correlation with the positive position of centroid population of pupils. Estimating the differences between the arithmetic means, we can notice differences, which were confirmed by Mahalanob's distance (Table 3). This function could be defined as a function of movement coordination, based on isolated variables that determine the discriminative function of motor space. From the values of centroid sign, which is a negative among athletes' samples, their direct relationship with the variables that discriminate them from the sample of students can be explained. These variables have negative values.

Table 3. Centroids of discriminant measures and Mahalanobis distance

	Mahalanobis distance			F-values	
	Root 1	G 1:1	G 2:2	G 2:2	
G_1:1	1.72	0.00	9.19	--	10.16
G_2:2	-1.72	14.72	0.00	15.10	--

In order to check the significance of the function and adequacy of results, F-value was calculated. Based on these indicators, we can conclude that the isolated discriminative function is statistically significant, with the relevant parameters of functions and that in most motor abilities is different, heterogeneous. Generally speaking, the results of the univariate analysis of motor skills are also confirmed on the multivariate level. The differences are in favor of the students in most of central regulation mechanism variables (structured movement, and synergistic regulation of muscle tone), in coordination, in some measures of flexibility and balance, in all those structures of movement that have more influence and importance in sports and other acyclic movements compared to racing and jumping athletic discipline.

CONCLUSION

The research was done on a sample of 180 respondents chronologically 15 ± 0.5 years old, with the aim of determining the difference between a student and junior athletes in the area of central regulation. By analyzing the differences in means of

tested measures of motor space among the students and athletes we can conclude that there exist significant differences in almost all measures but only in 7 cases that difference is statistically significant, that difference is 58% of the total number of measured variables. These differences were noted in almost all variables of coordination in favor of students compared to the athletes, whereas in the measures of flexibility and balance these differences quantitatively were almost identical. Generally speaking, students had better results within the mechanism of structuring movement, while the athletes achieved better results in the flexibility especially in those variables that were significant and dominant in athletic racing and jumping disciplines.

In the area of balance, two variables noted statistically significant differences, one in favor of an athlete (MSPZO), and one for the benefit of students (MSUOO). The students and athletes have similar abilities in the mechanism area of synergistic regulation and in the regulation of muscle tone. The remaining four variables from the area of balance and flexibility made the difference in favor of the athletes or students, but they are not statistically significant differences. This result is not surprising since students practice mostly sports games where coordination is probably more important in a given activity than in a racing or jumping disciplines. Also, the results of the canonical discriminative analysis in motor behavior showed a statistically significant difference, and that function is defined with measures of coordination for the benefit of students and measures of flexibility and balance in favor of the students and athletes, in other words it was defined in a bipolar way in a single space.

REFERENCES

1. Agrež, F. (1975). Kanoničke relacije mjera fleksibilnosti i prostora ostalih motoričkih sposobnosti [Canonical relations between measures of flexibility and space of other motor skills. In Croatian]. *Kineziologija*, 5(1-2), 113–123.
2. Anastasovski, A. (1981). Usporedna analiza antropometrijskih i motoričkih dimenzija kod učenika, sportista i ostalih [Comparative analysis of anthropometric and motor dimensions of the students, athletes and other. In Serbian]. *Fizička kultura*, 96–108.
3. Bratić, M., Đurašković, R., & Randelović, J. (2001). Morfološki i funkcionalni status školske dece i dece džudista [Morphological and functional status of school children and children judokas. In Serbian] U Zborniku N.Živanović (Ur.), VIII međunarodni naučni skup FIS Komunikacije Niš (30–33). Niš: Fakultet fizičke kulture.

4. Breslauer, N., Delija, K., & Mesarić, I. (2006). Kvantitativne razlike između skupina ispitanika u školskim atletskim varijablama [Quantitative differences between groups participants in school athletic variables. In Croatian] *Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa RH*, (84–87), Rovinj.
5. ojić, I., Kocić, M., & Milenković, D. (2007). Razlike u nekim motoričkim sposobnostima kod vrhunskih košarkaša i rukometaša [Differences in some motor skills in elite basketball and handball. In Serbian] *XIII FIS komunikacije*. Zbornik sažetaka (p.35). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
6. Cools, W., Christiane, M., & Andries, C. (2011). Fundamental movement skill performance of preschool children in relation to family. *Journal of Sports Sciences*, 29(7), 649–660.
7. Despot, A., & Viskić-Štaleb, N. (1983). Razlike među dvanaestogodišnjim učenicima i učenicama u nekim konativnim, morfološkim i motoričkim osobinama [Differences among the twelve year-old pupils and students in some conative, morphological characteristics and motor. In Croatian-Serbian] *Kineziologija*, 15, 63 - 67.
8. Delija, K., Šimenc, Z., & Vuleta, D. (1995). Razlike u nekim općim i situacijskim testovima motoričkih sposobnosti rukometaša i nerukometaša [Differences in some general and situational tests of motor skills handball and not handball. In Croatian]. *Kineziologija*, 27(1), 57–61.
9. Fransen, J., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Vaeyens, R., Leonir, M., & Philippaerts, R.M. (2012). Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6-12 years specializing in one versus sampling more than one sport. *Journal of Sports Sciences*, 4(13), 379–386.
10. Gajić, M. (1985). *Osnovi motorike čovjeka* [Fundamentals of human motorics. In Serbian-Croatian] Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
11. Gajić, M. (1990). *Transformacija koordinacije u zavisnosti od programa aktivnosti* [Coordinate transformations to a program of activities. In Serbian-Croatian] Zbornik radova, sv.5. (13–23).
12. Gabbett, T.J., Jenkins, D.G & Abernethy, B. (2011). Relationships between physiological, anthropometric, and skill qualities and playing performance in professional rugby league players. *Journal of Sports Science*, 29(15), 1655–1664.
13. Heyward, H.V., & Stolarczyk, M.L. (1996). *Applied Body Composition Assessment*. Champaign: Human Kinetics.
14. Heimar, S., & Medved, R. (1997). Funkcionalna dijagnostika treniranosti sportaša [Functional diagnostics of their fitness athletes. In Croatian] *Međunarodno savetovanje, Zbornika radova* (23-44). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
15. Ivanić, S., & Ivanić, V. (1999). *Predselekcija-kriterijumi i norme za određivanje predispozicija dece i omladine za vrhunska sportska dostignuća*. [Criteria and standards for determining the predisposition of children and youth for the top sports achievements. In Serbian]. Republički zavod za sport Beograd.
16. Kazemi, M. (2012). Relationships between injury and success in elite Taekwondo athletes. *Journal of Sports Sciences*, 30(3), 277–283.
17. Kos, D., Sitar, A., & Andrović, M. (2010). Razlike između dvije skupine učenika srednje škole različite angažiranosti u sportu u motoričkim testovima agilnosti [Differences between two groups of secondary school students in a variety of involvement in motor sport, agility tests. In Croatian] Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH, (124-129), Rovinj.
18. Kukolj, M. (1996). *Opšta antropomotorika* [General anthropomotorics. In Serbian] Beograd: Fakultet fizičke kulture
19. Kukolj, M., Bokan, B., Koprivica, V., Ugarković, D. (2001). Međusobna povezanost motoričkih sposobnosti učenika mlađeg školskog uzrasta u periodima njihovih značajnih promena [Interconnection motor abilities of younger school-age students in their periods of significant changes. In Serbian] Zbornik radova „Fiskomunikacije“ (70–78). Niš: Fakultet fizičke kulture
20. Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, D.J., & Viskić-Štaleb,

- N. (1975). *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine* [The structure and development of morphological and motor dimensions of youth] Beograd: Naučni institut fakulteta fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
21. Mihajlović, I. (1996). Selekcija i trenažni proces u sprintu [The selection and training process in the sprint. In Serbian] Zbornik radova *Vežbanje i trening* (239–244). Beograd: Fakultet fizičke kulture.
22. Nićin, Đ. (2000). Opšta antropomotorika [General anthropometrics. In Serbian] Novi Sad: Fakultet fizičke kulture.
23. Pavlović, R., Marković, S., Branković, N., & Kocić, J. (2008). Razlike motoričkog statusa dječaka i djevojčica predpubertetskog uzrasta [Differences motor status of boys and girls before puberty] *Fizička kultura, (Skoplje)* 36(2), 202–204
24. Pavlović, R. (2010). *Atletika* [Athletics. In Serbian] Univerzitet Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
25. Prahović, M., & Protić, J. (2007). Razlike u antropološkim obilježjima između četrnaestogodišnjih nogometaša, košarkaša, rukometaša i onih koji se ne bave sportom [Differences in the anthropological characteristics of 14 annual football, basketball, handball and those who are not involved in sports. In Croatian] Zbornik radova *16.ljetne škole kineziologa RH*, (470–476)
26. Pelemiš, M. & Stević, D. (2009). Uticaj realizacije programa nastave fizičkog vaspitanja na morfološke i motoričke sposobnosti [The effect of the implementation of physical education on morphological and motor skills. In Serbian] *Sport i Zdravlje*, 3(1), 117–124.
27. Radinović, Z. (2011). *Strukturalne razlike između učenika i atletičara juniorskog uzrasta* [Structural differences between students and junior athletes ages. In Serbian], (Masters thesis University of East Sarajevo). Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
28. Lepers, R., & Stapley, J.P. (2010). Differences in gender and performance in off-road triathlon *Journal of Sports Science*, 28(14), 1555–1562.
29. Stojiljković, S. (2003). *Osnove opšte antropomotorike* [Basics of general anthropometrics. In Serbian] Niš: Studentski kulturni centar.
30. Stojanović, T., Kostić, R., & Ahmetović, Z. (2006). *Teorija i metodika sportskog treninga*. [The theory and methodology of sports training. In Serbian] Novi Sad: Fakultet za sport i turizam.
31. Silva, D.A., Benedetti, T.R., Ferrari, E.P., Meurer, S.T., Antes, D.L., Silva, A.M., Santos, D.A., Matias, C.N., Sardinha, L.B., Vieira, F., & Petroski, E.L. (2012). Anthropometric profiles of elite older triathletes in the Ironman Brazil compared with those of young Portuguese triathletes and older Brazilians. *Journal of Sports Sciences*, 5(14), 479–484.
32. Tončev, I., Mihajlović, I. (1999). Razvoj izdržljivosti mladih atletičara trkača na srednjim i dugim stazama [The development of young athletes of endurance runners in the middle and long distance. In Serbian] III simpozijum *Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine*. Zbornik sažetaka (53).
33. Trent, P. (1996). Differences between male and female college lean sport athletes, nonlean sport athletes, and non athletes on behavioral and psychological indices of eating disorders. *Journal of Applied Sport Psychology*, 8(2), 218–230.
34. Vandorpe, B., Vandendriessche, J.B., Vaeyens, R., Pion, J., Lefevre, J., Renaat, M., Philippaerts, M.R., & Lenoir, M. (2012). The value of a non-sport-specific motor test battery in predicting performance in young female gymnasts. *Journal of Sports Sciences*, 30(5), 497–505.

Extract from the MSc thesis “Structural differences between the students and the junior track and field’s athletes” University of East Sarajevo, Faculty of Sport and Physical Education, Pale, Republic Srpska, BIH (March, 9, 2012).

Received: 29.06.2012.

Accepted: 20.02.2013.