KLINIČKE I MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOG MELANOMA

AUTORI

Mitrović Jasmina, Ćorac Aleksandar
Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica

KORESPONDENT

Jasmina Mitrović
Medicinski fakultet
Univerziteta u Prištini
Kosovska Mitrovica, Srbija
jasminamitrovic88@hotmail.com

SAŽETAK

Melanom je najagresivniji tumor kože koji ima sklonost ranom limfogenom i hematogenom metastaziranju. Hirurška ekscizija predstavlja metod lečenja. Rana dijagnoza je ključ uspešnog lečenja melanoma koja je primarno povezana sa Breslow i Clark stepenovanjem. Cilj našeg rada bio je ispitati pored ovih i druge prognostičke parametre kao što je starosna, polna i anatomska distribucija melanoma, makroskopski i histološki tip melanoma, veličina i prisustvo ostataka tumorskog tkiva na linijama resekcije. U istraživanju je korišćen biopsijski materijal Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u Prištini od 2004- 2017. godine. Analiza podataka pokazala je da je melanom češći kod starijih muškaraca (prosečne starost od 68.5 ± 14.6 godina) najčešće lokalizacije na leđima, zatim na glavi i vratu, gornjim i donjim ekstremitetima, kod kojih je češća pojava metastaza (Clark IV). Veći tumori zahtevaju širu eksciziju. Najveću učestalost pokazuje nodularni tip melanoma a dominantan histološki tip bio je epitelioidni. Između veličine tumorske promene i dubine invazije postoji statistički značajna osrednja pozitivna korelacija, što navodi na zaključak da se Clark i Breslow mogu koristiti kao prognostički faktori jer su međusobno komparativni.

Ključne reči: maligni melanom, morfologija

ENGLISH

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MALIGNANT MELANOMA

Mitrović Jasmina, Ćorac Aleksandar
Medical Faculty, University of Pristina, Kosovska Mitrovica, Serbia

SUMMARY

Melanoma is the most aggressive skin cancer that has a tendency of early lymphatic and hematogenous metastasis. Surgical excision constitutes as a methods of treatment. Early diagnosis is the key to successful treatment of melanoma, which is primarily associated with Breslow and Clark grading. The aim of this study was to investigate these and other prognostic parameters such as the age, the gender and the anatomical distribution of melanoma, macroscopic and histological type of melanoma, the size and the remains of the tumor tissue at the surgical margins. We analysed biopsy material of Institute of Pathology, Faculty of Medicine in Pristina from 2004 to 2017. year. We found that melanoma were more common at older men (average age of 68.5 ± 14.6 years), most common location was back, head and neck, upper and lower extremities, where were frequent occurrence of metastasis (Clark IV). Larger tumors require a wider excision. The greatest incidence was nodular type melanoma and predominant histological were epithelioid type melanoma. Between the size of the tumor masses and the depth of invasion there were no statistically significant positive correlation, which leads to the conclusion that the Clark and Breslow can be used as prognostic factors because they are mutually comparable.

Key words: Malignant melanoma, Morpholog

UVOD

Melanom je najagresivniji tumor kože s kontinuiranim porastom incidence u svetu. Ima sklonost ranom limfogenom i hematogenom metastaziranju. Najčešće se povezuje sa prekomernim nekritičnim izlaganjem ultravioletnim (UV) zracima. Može nastati na nepromenjenoj koži ili malignom transformacijom već postojećih nevusa, pre svega displastičnih. Klinički ga karakteriše diskoloracija (raznolikost boja) od svetlosivkaste, preko braonkaste do crne, ali može biti i bez pigmenta. Melanom prolazi kroz tri faze rasta: melanom in situ (označava fazu pojave malignih melanocita u bazalnom sloju epiderma), radijalna faza (označava fazu lateralnog širenja) i vertikalna faza (faza invazije derma). Prema kliničkoj i histološkoj slici postoje: lentigo melanom (eng. LM- lentigo melanoma in situ), površinsko šireći melanom (eng. SSM- superficial spreading melanoma), nodularni melanom (eng. NM - nodular melanoma) i akrolentiginozni melanom (eng. ALM - acral lentiginous melanoma).

Najčešće se melanom javlja na leđima muškaraca i na donjim ekstremitetima kod žena. Češći je kod starije populacije a učestalost se povezuje sa prekomernim izlaganjem UV zracima u mladosti. Klinički znaci koji upućuju na melanom su asimetričan oblik, nepravilni, nazubljeni ili izbrzdani rubovi, boja koja varira, veličina. Prognoza melanoma je primarno povezana sa debljinom tumora Breslow. U prognostičke svrhe koristi se i Clark stepenovanje. Terapija je uvek radikalna hirurgija, 1-3cm u zdravu tkivo. Rana dijagnoza je ključ uspešnog lečenja melanoma.

PREGLED LITERATURE

Melanom je tumor koji nastaje malignom transformacijom melanocita [3]. Melanom kože je najređi ali i najagresivniji maligni tumor kože [36]. Melanom tipično izgleda kao pigmentna kožna lezija crne ili tamnosmeđe boje, nepravilnih asimetričnih rubova i promera većeg od 6 mm. Tipično je da stalno raste a postoje dva tipa rasta: radijalni (horizontalno, površinsko širenje) i vertikalni rast (prema dubini i visini). Pokazuje izrazitu sklonosti ranom limfogenom i hematogenom metastaziranju [59]. Zapažena je veća učestalost melanoma u zemljama bliže ekvatoru s većim brojem sunčanih dana (Australija, Novi Zeland). Melanom kože je najučestaliji u Australiji. Naime, jedan od 14 muškaraca i jedna od 23 žene razvije melanom tokom života. Incidenca melanoma u SAD je jedna trećina, u Velikoj Britaniji jedna četvrtina incidence u Australiji. U Evropi najveća incidenca je u Skandinavskim zemljama, a najniža u južnoj Evropi [19, 23, 24] Incidenca melanoma u Srbiji prema podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ iznosi 5/100.000 WSR (engl. world standardized rate) [49]. Podaci IARC, GLOBOCAN projekta ukazuju da incidenca u Srbiji raste i iznosi 7,4 kod žena i 11,2/100.000 kod muškaraca.

Prema SZO godišnje se registruje 232 000 novih slučajeva sa oko 68 000 smrtnih slučajeva, dok je u Srbiji uzrok smrti u 1,1 % slučajeva [55]. Melanom kože je potencijalno najopasniji tip tumora koji čini 3-5% svih tumora kože i uzročnik je u više u 90% smrtnih slučajeva u odnosu na druge tumore kože (nemelanomski karcinomi)[28, 29, 30]. Generalno, češći je kod žena i to na nogama a kod muškaraca na leđima [15].

Nastaje kod osoba starije životne dobi (agresivnije forme)[8] i kod osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom (poremećaj reparacije i mutacijegena) [51], zbog prekomerne izloženosti UV zračenju, kod osoba svetlije puti (fototipovi kože 1 i 2 po Fitzpatrick-u, povećanog broja nevusa, gigantskih kongenitalnih nevusa, displastičnih nevusa [26, 60, 71], čestih sunčanih opekotina kože nastalih u ranom razvojnem periodu [50, 70].

Može nastati iz već postojećeg nevusa ili u 70-80% slučajeva de novo, na potpuno neizmenjenoj koži [37, 64, 66].

Klinička evolucija melanoma počinje kao slabo pigmentna makula. Najčešći znaci razvoja melanoma su: promena boje postojećeg mladeža, nejasna granica prema okolini, neravnomerno prebojena i nepravilna površina, ulceracija na površini, vlaženje, i najzad krvarenje i pojava sate-litskih promena u okolnoj koži, što možemo u prognostičke svrhe pratiti akronimskim pravilom ABCDEFG (eng. A: Asymmetry - asimetrija; B: Borders - ivice: nepravilne, izrečkane; C: Color - boja: različita prebojenost mladeža; D: Diameter - dijametar: preko 6 mm; E: Evolution - evolucija: promena boje, veličine, oblika, izgleda površine, vertikalni rast, pojava svraba ili krvavljenja; F: Firm - tvrdoća: nodus je solidne građe; G: Growing - rast nodusa)[10].

Histogeneza melanoma se odvija u 5 faza. U prvoj fazi je prisutna melanocitna hiperplazija (atipičan raspored bez ćelijske atipije), u drugoj melanocitna displazija (atipična melanocitna hiperplazija i stromalna reakcija), treća faza je melanom in situ, četvrta faza je invazivni melanom, peta metastatski melanom.

Patohistološki melanom prolazi kroz tri faze rasta: melanom in situ (pojava malignih melanocita u bazalnom sloju epidermisa), radijalna faza (lateralno širenje) i vertikalna faza (invazija dermisa) [18].

Prema kliničkim i histološkim odlikama definisana su 4 najčešća histogenetička tipa melanoma [11]. **Superficialno šireći melanom** (superficial spreading melanoma - SSM) je najčešći oblik melanoma koji se klinički ispoljava u vidu čvorića, šaren sa sivim, ljubičastim i crvenim mestima. To je pigmentna promena manja od 2,5 cm u prečniku. Najčešći je na nogama žena i trupu muškaraca. Ovo ukazuje da povremeno, ali i hronično izlaganje UV zračenju može biti inicijalni događaj u nastanku melanoma. Prva faza je akumulacija atipičnih ćelija iznad dermo-epidermalne granice. Morfološke karakteristike melanoma su: nejasne granice intraepidermalnih melanocita koji se šire lateralno, povećan broj melanocita iznad i ispod bazalnog sloja epiderma, u horizontalnoj fazi, a u vertikalnoj fazi rasta varijacije oblika i veličine ćelijskih gnezda i slivanje, atipija jedra, brojne mitoze, degeneracija i nekroza melanocita. **Nodularni melanom** (nodular melanoma- NM) čini 15-30% svih melanoma. Javlja se podjednako kod oba pola, između 40-50 godine života. Najčešći je na koži trupa. Klinički je u vidu izdignuća a melaninski pigment je oskudan ili odsutan. Ulceracije rano nastaju. Uniformno je crne boje. Histološki melanociti invadiraju u epiderm i derm, odlikuje se brzim tumorskom progresijom. Invazija melanomskih ćelija u epidermu nema tipično širenje. U dermu je prisutan čvor ili pak, mala gnezda tumorskih ćelija koje imaju ekspanzivan obrazac rasta. Ćelije su najčešće epitelioidne, ali mogu biti i vretenaste ili može postojati više ćelijskih tipova. **Lentigo maligni melanom** (lentigo maligna melanoma - LMM) se klinički ispoljava u vidu sporo rastuće makule različitog oblika, iregularne braon pigmentacije, veličine od 3-6 mm, nekada i većeg promera sa nepravilnim, nazubljenim ivicama.

Najčešće je na licu lokalizovan tj. obrazima osoba koje najveći deo vremena provode na suncu, starijih od 40 godina, ali i pglavini, čelu, spoljašnjoj ušnoj školjki. Ova anatomsko lokalizacija ukazuje na kumulativni efekat UV radijacije. Obično je prisutan 10 godina pre nego počne nagli rast. Javlja se u 5-15% svih melanoma. Histološki ga karakteriše sporo progresivna lentiginozna proliferacija atipičnih melanocita koji su poligonalni sa atipičnim jedrima u epidermu, ali i adneksalnim stukturama. Ukoliko dođe do pojave nodusa to ukazuje na vertikalnu fazu rasta. U gornjem delu derma se često nalazi limfocitni infiltrat sa plazma ćelijama, melanofagima i naglašena elastoza. **Akralni lentiginozni melanom** (acral lentiginous melanoma - ALM) je oblik čije se lezije nalaze u zadebljalom epidermu dlanova gde je najčešći i tabanima. Češći je kod muškaraca posle 60. godine. Klinički je u vidu pločaste makularne lezije. Histološki se vidi zamena bazalnog sloja keratinocita vretenastim malignim melanocitima koji proliferišu naviše i naniže. On je najređi tip tumora.

Mikroskopska podela melanoma kože se vrši prema Clark i Breslow klasifikaciji [11, 13, 52]. Nivo invazije po Clark-u označava nivo anatomske invazije melanoma u 5 nivoa. Nivo I: melanom ograničen na epiderm (in situ melanom), nivo II: melanom koji je ograničen na papilarni derm, nivo III: ograničenost papilarnog i retikularnog derma, nivo IV: zahvatanje retikularnog derma, nivo V: zahvatanje subkutisa i dubljih struktura. Poslednjih godina je utvrđeno da je određivanje invazije prema debljini zahvaćenosti po Breslow-u egzaktnije i preciznije [27, 32]. Breslow I: tumori debljine do 0,75 mm, Breslow II: tumori debljine od 0,76-1,50 mm, Breslow III: tumori debljine od 1,51-2,25 mm, Breslow IV: tumori debljine od 2,26-3 mm, Breslow V: tumori debljine iznad 3 mm. Margine resekcije određuju se na osnovu debljine tumora po Breslow-u prema evropskim smernicama za lečenje melanoma kože [21]. Za funkcionalne regije pglavine i lica (za kapke, nos i usne), mogu biti dozvoljene manje margine [28].

CILJ RADA

Imajući u vidu da su melanomi najređi ali i najagresivniji maligniteti kože definisani su sledeći ciljevi istraživanja: ispitati starosnu i polnu distribuciju ispitanika; odnos parametara tumorskog tkiva (veličina, Clark i Breslow stadijum) prema polu, ostacima tumorskog tkiva na linijama resekcije, makroskopskom tipu tumora, histološkom tipu tumora, lokalizaciji promena; kao i korelaciju između parametara tumorskog tkiva.

MATERIJAL I METODE

U istraživanju je korišćen biopsijski materijal Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u Prištini od januara 2004. godine do decembra 2017. godine, pacijenata operisanih na Klinici za hirurgiju KBC Priština - Gračanica, kao i Odeljenju za maksilofacijalnu hirurgiju ZC Kosovska Mitrovica. Retrospektivno je obrađeno 47 pacijenata sa dijagnozom malignog melanoma. Nakon makroskopskog pregleda dostavljenog operativnog materijala (dela ili celog tumora), merenja veličine tumora i adekvatnog opisa, uzeti su isecci za analizu. Tkivo je fiksirano u 10% puferizovanom formalinu i nakon standardizovane obrade obojeno metodom hematoksilin-eozin (HE). Histopatološka dijagnoza je postavljena na rutinskim mikroskopskim preparatima.

Za analizu primarnih podataka korišćene su deskriptivne statističke metode i metode za testiranje statističkih hipoteza. Od deskriptivnih statističkih metoda korišćene su za kontinuirane varijable medijana i minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost a kategorijalne varijable su prikazane kao apsolutni i relativni brojevi. S obzirom da kontinuirane varijable nisu zadovoljile normalnost raspodele za testiranje hipoteze o značajnosti razlike korišćene su neparametarske metode za poređenje između dve grupe Mann-Whitney, U test - test sume rangova i za poređenje između tri i više grupa Kruskal-Wallis-ov test. Za testiranje hipoteze o razlici učestalosti kategorijalnih varijabli korišćen je χ^2 test a za ispitivanje povezanosti korišćen je Spearman-ov koeficijent korelacije. Statističke hipoteze su testirane na nivou statističke značajnosti (alfa nivo) od 0.05. Za statističku obradu rezultata korišćen je softverski program SPSS Statistics 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Rezultati su obrađeni i prikazani putem tabelarnih i grafičkih prikaza.

REZULTATI

Istraživanjem je obuhvaćeno 47 ispitanika, 31 (66%) osoba muškog pola i 16 (34%) ženskog pola.

Prosečna starosna dob ispitanika je bila $68,5 \pm 14,6$ godina, Min-Max (32-94).

Prosečna starosna dob kod ispitanika muškog pola je iznosila $66,6 \pm 13,6$, Min-Max (42-91) a kod ženskog $72,3 \pm 16,3$, Min-Max (32-94). Starosna dob ispitanika ne razlikuje se statistički značajno ($t=1,265$, $p=0,212$).

S obzirom da su ključni prognostički parametri veličina tumora, kao i stepen invazije tumora po Clark-u i Breslow-u, rezultati dobijeni ispitivanjem odnosa ovih parametara prema polu prikazani su na tabeli 1.

Tabela 1. Parametri tumorskog tkiva prema polu.

Parametri	Pol		p
	Muški	Ženski	
Ukupan broj n (%)	31 (66,0)	16 (34,0)	
Velicina-Med (opseg), (cm)	1,5 (0,4-4,0)	1,55 (0,3-3,7)	0,973
Clark			
I n(%)	1 (3,2)	1 (6,3)	0,353
III n(%)	9 (29,0)	8 (50,0)	
IV n(%)	15 (48,4)	3 (18,8)	
V n(%)	6 (19,4)	4 (25,0)	
Breslow			
I n(%)	2 (6,5)	1 (6,3)	0,461
II n(%)	4 (12,9)	2 (12,5)	
III n(%)	20 (64,5)	8 (50,0)	
IV n(%)	4 (12,9)	5 (31,3)	
V n(%)	1 (3,2)	0 (0)	

Med- medijana, opseg (Min-Max), *-statistički značajna razlika

Medijana veličine tumora kod muškog pola je iznosila 1,5cm (opseg 0,4-4,0) a kod ženskog 1,55cm (opseg 0,3-3,7). Velicina tumora ne razlikuje se statistički značajno prema polu ($U=246,5$, $p=0,973$).

Stepen Clark se ne razlikuje statistički značajno prema polu ($U=209,0$, $p=0,353$) ali je učestalost stepena Clark IV statistički značajno učestalija kod muškog pola u odnosu na ženski pol ($\chi^2=3,923$, $p=0,048$).

Stepen Breslow-a se ne razlikuje statistički značajno prema polu ($U=219,0$, $p=0,461$).

Ostaci tumorskog tkiva na linijama resekcije nakon operativnog zahvata su ključni parametar koji određuje potrebu za ponovljenim hirurškim tretmanom, a rezultati njihovog ispitivanja u odnosu na parametre tumorskog tkiva (veličinu, Clark i Breslow stadijum), prikazani su na tabeli 2.

Tabela 2. Parametri tumorskog tkiva prema ostacima tumorskog tkiva na liniji resekcije.

Parametri	Ostaci tumorskog tkiva na liniji resekcije		p
	Da	Ne	
Ukupan broj n (%)	12 (25,5)	35 (74,5)	
Veličina-Med (opseg), (cm)	1,0 (0,3-3,7)	1,6 (0,4-4,0)	0,016 *
Clark			
I n(%)	1 (8,3)	1 (2,9)	0,632
III n(%)	5 (41,7)	12 (34,3)	
IV n(%)	3 (25,0)	15 (42,9)	
V n(%)	3 (25,0)	7 (20,0)	
Breslow			
I n(%)	1 (8,3)	2 (5,7)	0,269
II n(%)	4 (33,3)	2 (5,7)	
III n(%)	4 (33,3)	24 (68,6)	
IV n(%)	3 (25,0)	6 (17,1)	
V n(%)	0 (0)	1 (2,9)	

Med- medijana, opseg (Min-Max), *-statistički značajna razlika

Medijana veličine tumora kod ostataka tumorskog tkiva na liniji resekcije je iznosila 1,0 (opseg 0,3-3,7) a kada nije bilo ostataka tumorskog tkiva na liniji resekcije 1,6 cm (opseg 0,4-4,0). Veličina tumora je statistički značajno veća kada na liniji resekcije nema ostataka tumorskog tkiva ($U=112,5$, $p=0,016$).

Stepen Clark se ne razlikuje statistički značajno prema ostacima tumorskog tkiva na liniji resekcije ($U=191,5$, $p=0,632$).

Stepen Breslow se ne razlikuje statistički značajno prema ostacima tumorskog tkiva na liniji resekcije ($U=170,0$, $p=0,269$) ali je učestalost III stepena Breslow statistički značajno učestalija kod tumora koji nisu imali ostatke tumorskog tkiva na liniji resekcije ($\chi^2=4,607$, $p=0,032$).

Ispitivan je i odnos parametara tumorskog tkiva (veličina, Clark i Breslow stadijum) prema makroskopskom tipu tumora, sa rezultatima prikazanim na tabeli 3.

Tabela 3. Parametri tumorskog tkiva prema makroskopskom tipu tumora.

Parametri	Makroskopski tip tumora			p
	Nodularni	Akralni	Superficijalni	
Ukupan broj n (%)	44 (93,6)	2 (4,3)	1 (2,1)	
Veličina-Med (opseg), (cm)	1,5 (0,3-4,0)	0,7 (0,4-1,0)	0,5 (0,5-0,5)	0,05 2*
Clark				
I n(%)	0 (0)	1 (50,0)	1 (100,0)	0,02 6*
III n(%)	16 (36,4)	1 (50,0)	0 (0)	
IV n(%)	18 (40,9)	0 (0)	0 (0)	
V n(%)	10 (22,7)	0 (0)	0 (0)	
Breslow				
I n(%)	1 (2,3)	1 (50,0)	1 (100,0)	0,01 0*
II n(%)	5 (11,4)	1 (50,0)	0 (0)	
III n(%)	28 (63,6)	0 (0)	0 (0)	
IV n(%)	9 (20,5)	0 (0)	0 (0)	
V n(%)	1 (2,3)	0 (0)	0 (0)	

Med- medijana, opseg (Min-Max), *-statistički značajna razlika

Medijana veličine tumora kod nodularnog tipa je iznosila 1,5cm (opseg 0,3-4,0), kod akralnog tipa je iznosila 0,7cm (opseg 0,4-1,0) i kod superficijalnog tipa 0,5cm (opseg 0,5-0,5). Veličina tumora se statistički značajno ne razlikuje prema nalazu makroskopskog tipa tumora ($\chi^2=5,920$, $p=0,052$).

Stepen Clark se razlikuje statistički značajno prema nalazu makroskopskog tipa tumora ($\chi^2=7,271$, $p=0,026$) i to između nodularnog i akralnog tipa (0,039), kao i stepen Breslow ($\chi^2=9,212$, $p=0,010$), gde je razlika statistički značajna takođe između nodularnog i akralnog tipa ($p=0,014$).

Rezultati ispitivanja odnosa parametara tumorskog tkiva (veličina, Clark i Breslow stadijum) prema histološkom tipu tumora prikazani su na tabeli 4.

Tabela 4. Parametri tumorskog tkiva prema histološkom tipu tumora.

Parametri	Histološki tip tumora			P
	Epiteloidni	Vretenasti	Mešoviti	
Ukupan broj n (%)	36 (76,6)	5 (10,6)	6 (12,8)	
Veličina-Med (opseg), (cm)	1,45 (0,3-4,0)	1,5 (0,4-2,3)	1,8 (1,0-3,7)	0,495
Clark				
I n(%)	1 (2,8)	1 (20,0)	0 (0)	0,481
III n(%)	14 (38,9)	1 (20,0)	2 (33,3)	
IV n(%)	16 (44,4)	1 (20,0)	1 (16,7)	
V n(%)	5 (13,9)	2 (40,0)	3 (50,0)	
Breslow				
I n(%)	1 (2,3)	1 (50,0)	1 (100,0)	0,599
II n(%)	5 (11,4)	1 (50,0)	0 (0)	
III n(%)	28 (63,6)	0 (0)	0 (0)	
IV n(%)	9 (20,5)	0 (0)	0 (0)	
V n(%)	1 (2,3)	0 (0)	0 (0)	

Med- medijana, opseg (Min-Max)

Medijana veličine tumora kod epiteloidnog tipa je iznosila 1,45cm (opseg 0,3-4,0), kod vretenastog tipa je iznosila 1,5cm (opseg 0,4-2,3) i kod mešovito tipa 1,8cm (opseg 1,0-3,7). Veličina tumora se statistički značajno ne razlikuje prema nalazu histološkog tipa tumora ($\chi^2=1,407$, $p=0,495$).

Stepen Clark se ne razlikuje statistički značajno prema nalazu histološkog tipa tumora ($\chi^2=1,465$, $p=0,481$), kao ni stepen Breslow ($\chi^2=1,025$, $p=0,599$).

Ispitivanjem odnosa parametara tumorskog tkiva (veličina, Clark i Breslow stadijum) prema lokalizaciji promena, došli smo do rezultata koji su prikazani na tabeli 5.

Tabela 5. Parametri tumorskog tkiva prema lokalizaciji promena.

	Lokalizacija promena						p
	Glava i vrat	Leda	Gornji ekstremitet	Donji ekstremitet	Prednja strana grudnog koša	Ano-genitalna regija	
Ukupan broj n (%)	9 (19,1)	12 (25,5)	9 (19,1)	9 (19,1)	5 (10,6)	3 (6,4)	
Veličina-Med (opseg)	1,5 (0,5-3,7)	1,55 (0,9-2,8)	1,6 (0,4-4,0)	1,2 (0,98-3,4)	1,0 (1,0-1,5)	2,3 (0,3-4,0)	0,716
Clark							
I n(%)	1 (11,1)	0 (0)	1 (11,1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0,037*
III n(%)	0 (0)	3 (25,0)	3 (33,3)	4 (44,4)	4 (80,0)	3 (100,0)	
IV n(%)	2 (22,2)	9 (75,0)	5 (55,6)	2 (22,2)	0 (0)	0 (0)	
V n(%)	6 (66,7)	0 (0)	0 (0)	3 (33,3)	1 (20,0)	0 (0)	
Breslow							
I n(%)	1 (11,1)	0 (0)	1 (11,1)	0 (0)	1 (20,0)	0 (0)	0,581
II n(%)	0 (0)	1 (8,3)	1 (11,1)	2 (22,2)	0 (0)	2 (66,7)	
III n(%)	7 (22,2)	8 (66,7)	4 (44,4)	5 (55,6)	3 (60,0)	1 (33,3)	
IV n(%)	1 (66,7)	3 (25,0)	2 (22,2)	2 (22,2)	1 (20,0)	0 (0)	
V n(%)	0 (0)	0 (0)	1 (11,1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

Medijana veličine tumora ne razlikuje se statistički značajno u odnosu na lokalizaciju tumorskih promena ($\chi^2=2,893$, $p=0,716$).

Stepen Clark se razlikuje statistički značajno prema lokalizaciji tumora ($\chi^2=11,836$, $p=0,037$). Učestalost V stepena Clark je statistički značajno učestalija na glavi i vratu u odnosu na druge lokalizacije ($\chi^2=13,692$, $p<0,001$).

Stepen Breslow se ne razlikuje statistički značajno prema lokalizaciji tumora ($\chi^2=3,785$, $p=0,581$).

Rezultati ispitivanja korelacije između parametara tumorskog tkiva prikazani su na tabeli 6, kao i grafikonima 1 i 2.

Tabela 6. Korelacija između parametara tumorskog tkiva.

Parametri	Korelacija	Clark	Breslow
Veličina	R	0,186	0,396
	P	0,210	0,006*
	N	47	47
Clark	R		0,372
	P		0,010*
	N		47

*- statistički značajna povezanost

Između veličine tumorske promene i Breslow postoji statistički značajna osrednja pozitivna povezanost ($r=0,396$, $p=0,006$). Između Clark i Breslow takođe postoji statistički značajna osrednja pozitivna povezanost ($r=0,372$, $p=0,010$).

Grafikon 1. Korelacija između veličine tumorskog tkiva i Breslow-a.

Grafikon 2. Korelacija između Breslow-a i Clark-a.

DISKUSIJA

Učestalost malignog melanoma se povećava alarmantnom brzinom širom sveta u poslednjih 30-40 godina i nastavlja da raste. Osim medicinskog melanoma kože ima i veliki društveno-socijalni značaj [56, 31]. On je najagresivniji, ali najređi maligni tumor kože. Od njega su neuporedivo češći maligni tumori epidermalnog porekla, pre svega bazocelularni, pa skvamocelularni karcinom [48]. U istraživanju Vančetović Mijović i dr. melanom je činio svega 5,31 % među svim ispitivanim malignitetima kože svih lokalizacija [67]. Od 1787. kada je dat prvi opis melanoma, poznavanje melanoma je napredovalo. Kasnije Clark uvodi anatomske nivoe invazije malignog melanoma kao prognostički faktor pacijenata sa niskim, srednjim, i visokim rizicima od umiranja od ove bolesti. Nakon toga, Breslow ukazuje da debljina primarnog tumora se može koristiti za dobijanje sličnih prognostičkih podataka [11, 16].

Savremena literatura navodi veću incidencu melanoma kod osoba muškog pola [54, 63]. Melanom svih lokalizacija je čak devet puta češći kod muškaraca [67], dok se slični podaci navode i kada su u pitanju samo melanomi kože glave i vrata [25]. Od ukupnog broja ispitanika u posmatranom periodu (2004-2017. god.) u našem istraživanju, procentualno više je bilo osoba muškog pola 31 (66%). U svom istraživanju

Balch nije našao povezanost pola sa debljinom melanoma [7]. Naša istraživanja pokazuju da se veličina tumora ne razlikuje statistički značajno prema polu. Kod muškaraca je medijana veličine melanoma 1,5cm kod žena 1,55cm. Verovatnoća za razvoj metastaze i udaljene metastaze nakon dijagnoze primarnog tumora je značajno veća kod muškaraca nego kod žena [46], što je prikazano i našom studijom gde je učestalost IV stepena Clark-a statistički značajno veća kod muškog pola 15 (48,4 %). Balch navodi da osobe sa Clark nivoom IV imaju petogodišnje preživljavanje 4 do 7% [4]. Iz ovoga se može zaključiti da se melanom češće javlja kod osoba muškog roda, kod kojih je veća verovatnoća razvoja metastaza.

Starenje, odnosno životna dob, je jedan od faktora rizika za nastanak kako melanoma, tako i karcinoma epidermalnog porekla. Bez obzira na različitu etiologiju, oba tipa starenja (intrinzičko i ekstrinzičko) imaju opšte fundamentalne molekularne mehanizme, udružene sa narušavanjem homeostaze kako kolagena, kao osnovne strukturne komponente derma, tako i melanocita i keratinocita. Najvažniji cilj ovakvih istraživanja je sveobuhvatno sagledavanje problema hronološkog starenja kože u svrhu prevencije pojave benignih, a naročito malignih tumora [42]. Prosečna starosna dob u našem istraživanju je bila 68,5±14,6 godina (najmlađi pacijent je imao 32, a najstariji 94 godina). I drugi autori, takođe, navode da se melanom češće javlja kod starijih osoba [25, 67]. Starosna dob ispitanika u našem istraživanju ne razlikuje se statistički značajno prema polu. Prekomerna izloženost UV zračenju je potvrđen faktor rizika za nastanak melanoma kože a naročito njen kumulativni efekat [65]. Štetan uticaj UVA zračenja potvrđuju i eksperimentalni modeli na ženama BALBc soja miševa, naročito onim koji nisu tretirani kremama sa zaštitnim faktorom [57]. Society of the Surgical Oncology (2003) prepoznaje starost kao značajan prognostički faktor melanoma koji se povezuje sa drugim varijablama poput debljine tumora, ulceracija, itd. Starije osobe u odnosu na mlađe imaju deblje melanome, dublje ulceracije [14]. Deblji melanomi predstavljaju biološku agresivnost lezija sa izraženijim vertikalnim u odnosu na radialni rast [17]. Jaka korelacija između debljine melanoma sa većim rizikom od regionalnih metastaza je demonstrirana u nekoliko studija [11, 12, 20, 33, 34, 69]. Objašnjenje češće prisutnih debljih melanoma kod starijih osoba u odnosu na mlađe je da se manje značaja pridaje promenama na koži i rane znake promena melanoma ne prijavljuju se na vreme dok se ne jave znaci uznapredovalog procesa kao što su ulceracije, vlaženje, krvarenje [9, 22].

U našem istraživanju veličina tumora je statistički značajno veća kada na liniji resekcije nema ostataka tumorskog tkiva ($p=0,016$). Takođe, učestalost III stepena Breslow 24 (68,6%) statistički značajno veća kod tumora koji nisu imali ostatke tumorskog tkiva na liniji resekcije. Ovo upućuje da veći tumor zahteva širu eksciziju promene. U istraživanju Baron-a 1996. navodi se da je konzervativni pristup hirurškom lečenju melanoma razuman. Isto, svi lokalni recidivi su uspešno tretirani širom ekscizijom [68]. Hirurške smernice danas za adekvatnom ekscizijom su da se ukloni ceo melanom (melanoma in situ) sa 0,5cm margine u normalnu kožu koja okružuje melanom. Kod melanoma tanjeg od 1mm ili debljine 1mm dovoljna je ekscizija širine 1cm. Melanom debljine 1-2mm zahteva rub isečka 1-2 cm, dok je za melanom debljine 2-4mm prihvaćena širina rubnog isečka od 2cm, kao i kod bolesnika s primarnim tumorom debljim od 4mm [2, 40, 41]. U ovom trenutku, nije jasno kolika je potrebna širina margine za pacijente sa debelim melanoma

(preko 4 mm). Velike ekscizije melanoma stadijuma 3 i 4 lokaliziranih na licu su ponekad teško izvodive, pa se iz funkcijskih i estetskih razloga rubovi mogu smanjiti [43]. Danas se ovaj princip u lečenju melanoma primarno koristi kod bolesnika s dijagnozom melanoma in situ i tankim invazivnim melanomima [53]. U ranijim istraživanjima (Veronesi et al. 1988) se navodi da je dubina invazije u korelaciji sa rizikom od lokalnog recidiva i metastaza. Kod bolesnika s melanomom primećen je povećan rizik za razvitak novog primarnog melanoma, koji se prema nekim istraživanjima kreće od 1% do 8% [62]. Smatra se da bi genetski faktori mogli biti uzrok u određenom broju slučajeva melanoma koji se razvija ranije [35].

Superficialni i nodularni melanomi čine oko 65% i 20%, od svih primarnih melanoma [10]. U našem istraživanju najveću učestalost imaju nodularni melanomi 44 (93,6%) nakon toga akralni 2 (4,3%) a zatim superficialni melanomi 1 (2,1%). Nodularni melanom ima tendenciju da se brzo širi i na kraju metastazira u vitalnim organima [45]. Na šta upućuju rezultati ove studije gde nodularni melanom takođe u najvećem broju slučajeva dostiže nivo III i IV u odnosu na superficialni i akralni melanom. Metastatsko širenje moguće je limfnim putevima ili krvlju, a prve metastaze često se nalaze u regionalnim limfnim čvorovima. Kod hematogenog širenja najčešće su zahvaćeni jetra, pluća, mozak i kosti, prednja očna komora [64].

U našem istraživanju najveću učestalost imaju epiteloidni melanomi 36 (76,6%), nakon toga mešoviti melanomi 6 (12,8%) a zatim vretenasti 5 (10,6%). Veličina tumora se statistički značajno ne razlikuje prema nalazu histološkog tipa tumora. Stepen Clark i Breslow se ne razlikuju statistički značajno prema nalazu histološkog tipa tumora.

Lokalizacija melanoma može biti različita. Melanom je češći kod žena na nogama a kod muškaraca na leđima [15]. Osim efektom ultravioletnog zračenja ovo se može objasniti, delimično, razlikom u oblačenju između muškaraca i žena. Melanom je u populaciji do 40 godina češći na predelima povremeno izloženim suncu (trup ili donji ekstremiteti), dok je za muškarce i žene preko 60 godina, melanom najčešći na hronično izloženim mestima (glava i vrat) [72]. Melanomi glave i vrata su češći kod starije populacije [9]. U našem istraživanju melanom je najčešće lokalizovan na leđima 12 (25,5%), nakon toga na glavi i vratu 9 (19,1%), gornjim ekstremitetima 9 (19,1%), donjim ekstremitetima 9 (19,1%). U najmanjem procentu melanomi su lokalizovani na prednjoj strani grudnog koša 5 (10,6%), anogenitalnoj regiji 3 (6,4%). Melanom gornjih ekstremitet ima statistički bolji stopu preživljavanja od melanoma trupa [20, 39, 61]. Melanomi ekstremiteta imaju bolju prognozu od melanoma glave, vrata i trupa. 10-godišnja stopa preživljavanja u odnosu kada je primarni melanoma primećen na ekstremitetima je 90% u odnosu na 70% kada u melanom na trupu, glavi ili vratu [44, 58]. Poznato je da pacijenti sa melanomom glave ili vrata imaju znatno veće stope moždanih metastaza u poređenju sa onima sa ekstremiteta ili trupu [1]. Naši rezultati potvrđuju ove tvrdnje jer je učestalost V stepena Clark 6 (66,7%) statistički značajno veća kod melanoma lokalizovanih na glavi i vratu u odnosu na druge lokalizacije. Breslow and Wanbo su pokazali da debljina tumora i Clark' nivoi su podudarni za nivo II and V ali ne za nivo III i IV gde je bilo velike varijacije u debljini tumora i stopi preživljavanja [12, 69]. U našem istraživanju veličina melanoma ne razlikuje se statistički značajno u odnosu na lokalizaciju javljanja.

Između veličine tumorske promene i Breslow stadijuma postoji statistički značajna osrednja pozitivna povezanost.

Između Clark i Breslow takođe postoji statistički značajna osrednja pozitivna povezanost ($r=0,372$, $p=0,010$). Preporučeno je da Clark stadijumi se koriste kao kriterijumi u AJCC staging system i da bude uključen u patološke izveštaje [5, 6, 38].

Debljina tumora, pol, anatomska lokacija, a nivo invazije su veoma značajni prognostički faktori sa čime je saglasna naša studija [27].

ZAKLJUČAK

U skladu sa definisanim ciljevima izvedeni su sledeći zaključci: maligni melanom je češći kod muškaraca i generalno kod starijih osoba (prosečne starost od 68.5 ± 14.6 godina), sa najčešćom lokalizacijom na leđima, zatim na glavi i vratu, gornjim i donjim ekstremitetima, najređe na pred-

njoj strani grudnog koša i anogenitalnoj regiji. Kod ovih ispitanika nađena je dublja invazija malignih melanocita (Clark IV), što sveukupno utiče na češću pojavu metastaza kod osoba muškog pola. Prosečna veličina tumora bila je oko 1,5 cm, bez polne predilekcije, statistički značajno veća u tumorima koji su u prvom aktu kompletno uklonjeni, što navodi na dodatni zaključak da veći tumori zahtevaju širu eksciziju. Maligni melanom je u skoro 94% slučajeva imao nodularni makroskopski oblik sa najdubljom invazijom potvrđenom gradiranjem po Clark-u i Breslow-u. U oko 3/4 svih slučajeva dominantan histološki tip bio je epiteloidni. Između veličine tumorske promene i dubine invazije postoji statistički značajna osrednja pozitivna korelacija, što navodi na zaključak da se Clark i Breslow mogu koristiti kao prognostički faktori jer su međusobno komparativni iako im različite studije daju različite prednosti u prognozi.

LITERATURA

1. Anne M. Lachiewicz, MPH; Marianne Berwick, PhD, MPH; Charles L. Wiggins, PhD, MSPH; et al Nancy E. Thomas, MD, PhD Survival Differences Between Patients With Scalp or Neck Melanoma and Those With Melanoma of Other Sites in the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program Arch Dermatol. 2008;144(4):515-521.
2. Akhtar S, Bhat W, Magdum A, et al. Surgical excision margins for melanoma in situ. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67:320-323.
3. Baderca F, Vincze D, Balica N, Solovan C. Mucosal melanomas in the elderly: Challenging cases and review of the literature. Clin Interv Aging. 2014;9:929-937.
4. Balch A. Multifactorial Analysis of Melanoma: Prognostic Histopathological Features Comparing Clark's and Breslow's Staging Methods 1978 Vol. 188 * No. 6 Ann. Surg. *733-742.
5. Balch CM, Buzaid AC, Soong SJ et al. (2001a) Final version of the American Joint Committee on Cancer staging system for cutaneous melanoma. J Clin Oncol 19:3635-48.
6. Balch CM, Gershenwald JE, Soong SJ et al. (2009) Final version of 2009 AJCC melanoma staging and classification. J Clin Oncol 27: 6199-206.
7. Balch CM, Soong SJ, Gershenwald JE, Thompson JF, Reintgen DS, Cascinelli N. Prognostic factors analysis of 17,600 melanoma patients: validation of the American Joint Committee on Cancer melanoma staging system. J Clin Oncol. 2001 Aug 15; 19(16):3622-34.
8. Balch CM, Soong SJ, Gershenwald E, Thompson JF, Coit DG, Atkins MB, Ding S, Cochran AJ, Eggermont AM, Flaherty KT, et al. Age as a prognostic factor in patients with localized melanoma and regional metastases. Ann Surg Oncol. 2013;20:3961-3968.
9. Ballantyne AJ. Malignant melanoma of the skin of the head and neck. An analysis of 405 cases. The American Journal of Surgery. 1970;120(4):425-431.
10. Barnhill RL, Mihm MC, Jr. The histopathology of cutaneous malignant melanoma. Semin Diagn Pathol. 1993; 10 (1):47-75.
11. Breslow A. Thickness, cross sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous melanoma. Ann Surg 1970; 172(5): 902-8.
12. Breslow, A.: Tumor Thickness, Level of Invasion And Node Dissection In Stage I Cutaneous Melanoma. Ann. Surg., 182:572, 1975.
13. Breslow A, Cascinelli N, van der Esch EP, Morabito A. Stage I Melanoma of the limbs: assessment of prognosis by levels of invasion and maximum thickness. Tumori 1978; 64(3): 273-84.
14. Chao C, Martin RCG, Ross MI, et al. Correlation between prognostic factors and increasing age in melanoma. Ann Surg Oncol. 2004; 11: 259-264.
15. Chevalier V., Barbe C., Le Clainche A., Arnoult G., Bernard P., Hibon E. Comparison of anatomical locations of cutaneous melanoma in men and women: a population-based study in France. Br J Dermatol. 2014;171(3):595-601.
16. Clark WH Jr: The histogenesis and biologic behavior of primary human malignant melanomas of the skin. Cancer Res 29: 705-727, 1969.
17. Clark, W. H., Ainsworth, A. M., Bernardino, E. A., et al.: The Developmental Biology Of Primary Human Malignant Melanoma. Semin. Oncol. 2:83, 1976.
18. Clark WH, Elder DE, Van Horn M. The biologic forms of malignant melanoma. Hum Pathol 1986;17:443-450.
19. Clinical Practice Guidelines in Australia and New Zealand for the Management of Melanoma. 2010. <https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/melanoma-guideline-nov08-v2.pdf>

20. Cohen, M. H., Ketcham, A. F., Felix, E. L., et al.: Prognostic Factors In Patients Undergoing Lymphadenectomy For Malignant Melanoma. *Ann Surg.*, 186:635, 1977.
21. Dummer R, Hauschild A, Guggenheim M, Keilholz U, Pentheroudakis G. ESMO Guidelines Working Group. Cutaneous melanoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol.* 2012; 23 (7):vii86-91.
22. Evaluation of factors associated with skin self-examination. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 1999;8:971-97.
23. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. *Int J Cancer.* 2010 Dec 15; 127(12):2893.
24. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. *Int J Cancer.* 2015 Mar 1;136(5):E359-86.
25. Filipović M, Filipović T, Mladenović J, Šulović N, Mijović M: Melanom glave i vrata - kliničke i patohistološke karakteristike. *Medicinski arhiv Kosova i Metohije*, 2012, 3-4, 50-55.
26. Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. *Arch Dermatol.* 1988 Jun;124(6):869-71.
27. Garbe C, Buttner P, Bertz J, Burg G, d'Hoedt B, Drepper H, et al. Primary cutaneous melanoma. Identification of prognostic groups and estimation of individual prognosis for 5093 patients. *Cancer* 1995; 75(10): 2484-91.
28. Garbe C, Hauschild A, Volkenandt M, Schadendorf D, Stolz W, Reinhold U, et al. Evidence and interdisciplinary consensus-based German guidelines: surgical treatment and radiotherapy of melanoma. *Melanoma Res.* 2008;18: 61.
29. Garbe C, Peris K, Hauschild A, Saiag P, Middleton M, Spatz A, et al. Diagnosis and treatment of melanoma: European consensus-based interdisciplinary guideline. *Eur J Cancer.* 2010;46: 270-83.
30. Garbe C, Peris K, Hauschild A, Saiag P, Middleton M, Spatz A, et al. Diagnosis and treatment of melanoma. European consensus-based interdisciplinary guideline-- Update 2012. *Eur J Cancer.* 2012;48: 2375-90. doi:10.1016/j.ejca.2012.06.013.
31. Gery P, Guy, Donatus U, Ekwueme, Florence K, Tangka, Lisa C, Richardson. Melanoma Treatment Costs A Systematic Review of the Literature, 1990-2011. *Am J Prev Med.* 2012;43(5):537-545.
32. Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, Gullestad HP, Hellborg H, Månsson-Brahme E, Ingvar C, Ringborg U. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial. *Lancet.* 2011; 378(9803): 1635-42.
33. Hansen, M. G. and McCarten, A. B.: "Tumor Thickness And Lymphocyte Infiltration In Malignant Melanoma Of The Head And Neck. *Am. J. Surg.*, 128:557, 1974.
34. Holmes, E. C., Moseley, H. S., Morton, D. L., et al.: A Rational Approach To The Surgical Management Of Melanoma. *Ann. Surg.*, 186:481, 1977.
35. Jeannot J, Stam-Posthuma, Caroline van Duinen, Eric Scheffer, Jacqueline Vink, Wilma Bergman. Multiple primary melanomas. 2001;44: 22-27.
36. Jerant AF, Johnson JT, Sheridan CD, Caffrey TJ. Early detection and treatment of skin cancer. *Am Fam Physician.* 2000 Jul 15;62(2):357-68,375-6,381-2.
37. Kaddu S, Smolle J, Zenahlik P, Hofmann-Wellenhof R, Kerl H. Melanoma with benign melanocytic naevus components: reappraisal of clinicopathological features and prognosis. *Melanoma Res.* 2002;12: 271-8.
38. Karakousis CP, Emrich LJ, Rao U. Tumor thickness and prognosis in clinical stage I malignant melanoma. *Cancer.* 1989 Oct 1; 64(7):1432-6.
39. Knutson, C. O., Hori, J. M. and Spratt, J. S., Jr.: Melanoma. *Cur. Probl. Surg.*, December, 1971.
40. Kunishige JH, Brodland DG, Zitelli JA. Surgical margins for melanoma in situ. *J Am Acad Dermatol.* 2012;66:438-444.
41. Leilabadi SN, Chen A, Tsai S, et al. Update and review on the surgical management of primary cutaneous melanoma. *Healthcare.* 2014;2:234-249.
42. Leštarević S, Petrović A, Savić S, Mandić P, Mijović M, Vitković L: Histološke karakteristike intrizičnog starenja kože. *Praxis Medica* 2013; 42 (3), 67-72.
43. Lipozenčić J, Pašić A (2009) *Dermatološka onkologija*, prvo izdanje, Zagreb, Medicinska naklada.
44. Masback A, Olsson H, Westerdahl J, et al. Prognostic factors in invasive cutaneous malignant melanoma: a population-based study and review. *Melanoma Res.* 2001;11:435-445.
45. Mehmet Ali Erkurt, Ismet Aydogdu, Irfan Kuku, Emin Kaya, Yalcin Basaran Nodular melanoma presenting with rapid progression and widespread metastases: a case report *J Med Case Reports.* 2009; 3: 50.
46. Mervic. Time Course and Pattern of Metastasis of Cutaneous Melanoma Differ between Men and Women Published: 2012;7:32955.
47. Meyle KD, Guldberg P. Genetic risk factors for melanoma. *Hum Genet.* 2009;126 (4):499-510.
48. Mijović M, Mitić N, Đerković B, Filipović M, Savić S, Leštarević S, Ilić A: Morfološko-kliničke karakteristike karcinoma kože glave epidermalnog porekla. *Praxis Medica* 2015; 44 (1), 79-90.
49. Miljuš D, Živković S, Perišić S. Cancer Incidence and mortality in central Serbia. Report of the Cancer registry of central Serbia Department for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Institute of Public Health of Serbia "Dr Milan Jovanović Batut" 2010.
50. Moan J, Grigalavicius M, Baturaite Z, Dahlback A, Juzeniene A. The relationship between UV exposure and incidence of skin cancer. *Photodermatol Photoimmunol Photomed.* 2015;31(1):26-35.

51. Mocellin S, Verdi D, Nitti D. DNA repair gene polymorphisms and risk of cutaneous melanoma: a systematic review and meta-analysis. *Carcinogenesis*. 2009;30(10):1735-4343.
52. Morton DL, Davtyan DG, Wanek LA, Foshag U, Cochran AJ. Multivariate analysis of the relationship between survival and the microstage of primary melanoma by Clark level and Breslow thickness. *Cancer* 1993; 71(11): 3737-43.
53. Rigel DS, et al (2011) *Cancer of the skin 2-nd ed.*, New York, Elsevier.
54. Røksahm T. E., Bergva G., Hestvik U. E., and Møller B. Sex differences in rising trends of cutaneous malignant melanoma in Norway, 1954-2008. *Melanoma Res.* 2013;23:70-78.
55. Robyn Lucas, Tony McMichael, Wayne Smith, Bruce Armstrong. Environmental Burden of Disease Series, Solar Ultraviolet Radiation. Global burden of disease from solar ultraviolet radiation. Environmental burden of disease series; 13. World Health Organization 2006.
56. Sabine Fischbeck, Barbara H. Imruck, Maria Blettner, Veronika Weyer, Harald Binder, Sylke R. Zeissig, Katharina Emrich. Psychosocial Care Needs of Melanoma Survivors: Are They Being Met? *PLoS One*. 2015; 10(8): e0132754.
57. Savić S, Mijović M, Ilić A, Mandić P, Đerković B: Ultravioletno A zračenje i fotostarenje kože miševa. *Praxis Medica*, 2017; 46 (1-2), 1-7.
58. Schuchter L, Schultz DJ, Synnestvedt M, et al. A prognostic model for predicting 10-year survival in patients with primary melanoma. The Pigmented Lesion Group. *Ann Intern Med.* 1996;125:369-375.
59. Sharpless SM, Das Gupta TK. Surgery for metastatic melanoma. *Semin Surg Oncol* 1998; 14(4): 311-8.
60. Shors AR, Kim S, White E i sur. Dysplastic naevi with moderate to severe histological dysplasia: a risk factor for melanoma. *Br J Dermatol.* 2006; 155 (5):988-93.
61. Smith, J. L.: *Histopathology And Biologic Behavior Of Malignant Melanoma In Neoplasms Of The Skin And Malignant Melanoma*. Chicago, Year Book Medical Publishers, Inc., 1976.
62. Stam- Posthuma JJ, Van Duinen C, Scheffer E et al. (2001) Multiple primary melanomas. *J Am Acad Dermatol* 44:22.
63. Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program (www.seer.cancer.gov) SEER*Stat Database: Mortality—All COD, Aggregated With State, Total U.S. (1990-2010) <Katrina/Rita Population Adjustment>, National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Surveillance Systems Branch, released April 2013.
64. Šitum M. Melanom (2014). U: Basta-Juzbašić A (Ur.) *Dermatovenerologija*. Zagreb: Medicinska naklada, str 687-703.
65. Tatalovich Z, Wilson JP, Mack T, Yan Y, Cockburn M. The objective assessment of lifetime cumulative ultraviolet exposure for determining melanoma risk. *J Photochem Photobiol B.* 2006 Dec 1;85(3):198-204. Epub 2006 Sep 11.
66. Thomas NE, Groben P. Invasive superficial spreading melanomas arising from clinically normal skin. *J Am Acad Dermatol.* 2004;51: 466-70.
67. Vančetošević Mijović M., Mitić N., Vukićević D., Dolićanin Z., Đerković B.: Histopatološke i kliničko-morfološke karakteristike malignih tumora kože. *Praxis Medica*, 2009; 37 (1-2), 85-92.
68. Wagner JD, Gordon MS, Chuang TY, et al.: Current therapy of cutaneous melanoma. *Plast Reconstr Surg* 105 (5): 1774-99; 1800-1, 2000.
69. Wanebo, H. J., Fortner, J. G., Woodruff, J., et al.: Selection Of The Optimum Surgical Treatment Of Stage I Melanoma by Depth Of Microinvasion: Use Of The Combined Microstage Technique (Clark-Breslow). *Ann. Surg.*, 182:302, 1975.
70. Weir HK, Marrett LD, Cokkinides V, Barnholtz-Sloan J, Patel P, Tai E, et al. Melanoma in adolescents and young adults (ages 15-39 years): United States, 1999-2006. *J Am Acad Dermatol.* 2011;65(5) Suppl 1:S38-49.
71. Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. *Cancer Causes Control.* 2001; 12 (1):69-82.
72. Youl PH, Youlten DR, Baade PD. Changes in the site distribution of common melanoma subtypes in Queensland, Australia over time: implications for public health campaigns. *Br J Dermatol.* 2013;168:136-144.