***Ralstonia pseudosolanacearum* - PATOGEN RUŽE**

Maja Đurić

Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

E-mail: maja.djuric1997@gmail.com

Izvod

Ruža predstavlja jednu od najznačajnijih ukrasnih biljaka u vrtovima, baštama i parkovima širom planete, te su njeni cvetovi među najprepoznatljivijim i najomiljenijim na svetu. Lepota ove biljke ugrožena je potencijalnim napadom različitih štetočina i patogena, među kojima je i fitopatogena bakterija *Ralstonia pseudosolanacearum* (filotip I, rasa 1, biovar 3). Na ružama prouzrokuje bakterijsku uvelost, kržljivost, žućenje listova i pojavu belog eksudata. Nalazi se na EPPO A2 karantinskoj listi, kao i na A1 listi (Aneks II A) u Evropskoj uniji. Prvi put je uočena na ružama u Holandiji, odakle se proširila u druge zemlje. U Republici Srbiji prisustvo ove bakterije još uvek nije uočeno, međutim, usled mogućeg razvoja latentnog oboljenja, postoji veliki rizik od njenog širenja razmnožavanjem ili trgovinom biljnim materijalom. Zbog toga je neophodno sprovođenje preventivnih mera zaštite, odnosno proizvodnja zdravog sadnog materijala i biljni karantin. Stvaranje sorti rezistentnih na *R. pseudosolanacearum* otežan je zbog heterogenosti njene populacije. Rađena su različita istraživanja o epidemiologiji *R. pseudosolanacearum* na ružama, međutim, precizan domet domaćina ovog patogena je još uvek nedovoljno istražen.

Ključne reči: ruža, *Ralstonia pseudosolanacearum*, fitopatogene bakterije

UVOD

Ruža (*Rosa*) je drvenasta biljka iz istoimene familije (*Rosaceae*). Zbog izuzetne lepote i prijatnog mirisa, grčka pesnikinja Safo nazvala je ružu "Kraljicom cveća". Potiče sa severne hemisfere, na Zemlji cveta milionima godina, a tokom svoje duge istorije opisana je u brojnim pesmama i korišćena za izražavanje osećanja, stavova, ljubavi i vere. Većina ruža je listopadna, međutim postoje neke vrste koje su zimzelene. Stabljika je prekrivena trnjem, a listovi su naizmenični, nazubljenih rubova. Ruže mogu biti čajevke, mnogocvetnice, penjačice, grmolike, minijature, polegle i stablašice (Ševar, 2016). Uzgajaju se prvenstveno zbog raskošnih cvetova koji, usled postojanja brojnih hibrida i kultivara, mogu biti različitih boja. Pored toga što se uzgaja kao ukrasna biljka, ruža ima primenu u kozmetici, kulinarstvu i medicini.

Ruže vole dobro osunčana mesta, sa minimum 6-7 sati prirodne svetlosti dnevno i treba ih saditi na mestima sa dobrim protokom vazduha. Rastu na različitim tipovima tla, ali ne vole mesta gde se vlaga predugo zadržava (Ševar, 2016). Procenjuje se da je do sada stvoreno oko 35 000 sorti ruže, a Ekvador je jedan od najvećih proizvođača i izvoznika ruže na svetu (Solano, 2020).

Već u proleće, nakon pojave prvih listova, ruža pored redovne nege zahteva primenu hemijskih sredstava za zaštitu bilja jer je, kao i sve druge biljke, podložna napadu različitih patogena i štetočina. Kada su štetočine u pitanju, ruže najčešće stradaju od velike ružine lisne vaši (*Macrosiphum rosae*), ružine štitaste vaši (*Aulacaspis rosae*), bele ružine cikade (*Edwardsiana rosae*), zlatne ružine bube (*Cetonia aurata*), ružine lisne ose (*Arge pagana*) i ružine pipe (*Otiorynchus fullo*) (Kereši, 2016). U vlažnim vremenskim uslovima javlja se velika opasnost od napada fitopatogenih gljiva kao što su *Diplocarpon rosae* (prouzrokovatelj crne pegavosti ruže), *Phragmidium mucronatum* (prouzrokovatelj rđe ruže), *Sphaeroteca pannosa* (prouzrokovatelj pepelnice) (Forgić, 2019). Iako su gljive najčešći prouzrokovatelji oboljenja, kao ograničavajući faktor u uzgoju ruža poslednjih godina izdvaja se i bakterija *Ralstonia pseudosolanacearum*.

Klasifikacija *Ralstonia solanacearum*. *Ralstonia solanacearum* je fitopatogena bakterija koja prouzrokuje uvelost, kržljanje i žutilo biljaka. Parazitira biljke iz čak 50 različitih botaničkih familija i ima oko 450 domaćina, pri čemu najveće ekonomske štete pravi na krompiru, paradajzu, patlidžanu, duvanu, bananama, kikirikiju i đumbiru. Karakteriše je heterogena bakterijska populacija, te se izolati značajno razlikuju po patogenosti i biohemijskim osobinama (Balaž, 2010). Pre razvoja molekularnih metoda istraživanja, *Ralstonia solanacearum* je bila podeljena na pet rasa (na osnovu biljke domaćina) i šest biovara (na osnovu biohemijskih karakteristika) (EPPO, 2017). Međutim, takva podela nije odgovarala filogenetskim vezama različitih sojeva ove bakterije, te se nije održala.

Iako je bila klasifikovana kao jedna vrsta, 1980-ih je otkriveno da različiti sojevi *R. solanacearum* pokazuju DNK srodnost manju od 70%, da imaju različita fiziološka svojstva i filogenezu. Stoga, grupa sojeva koji pripadaju ovoj vrsti nazvana je "Ralstonia solanacearum kompleks vrsta" (EPPO, 2017). Koncept „kompleks vrsta“ postaje široko prihvaćen tek 2000-tih, kada je *Ralstonia solanacearum* na osnovu filogenetske analize DNK podeljena na četiri filotipa različitog geografskog porekla: filotip I (poreklom iz Azije), filotip II (poreklom iz Južne Amerike), filotip III (poreklom iz Afrike) i filotip IV (poreklom iz Indonezije). Razvojem molekularnih metoda istraživanja karakteristika bakterija, ova klasifikacija je podlegla značajnim promenama (tabela 1).

Podaci dobijeni filogenetskom analizom sekvenci ribozomalnih gena 16S-23S rRNK, endoglukanaze i DNK hibridizacijom omogućili su preciznije razdvajanje *Ralstonia solanacearum* kompleksa vrsta. Dokazano je da on sadrži sojeve koji imaju visok stepen sličnosti sekvenci gena 16S-23S rRNK, te je podeljen u tri ge-

novrste (Safni, 2014): *Ralstonia pseudosolanacearum*, *Ralstonia solanacearum* i *Ralstonia syzygii* koja obuhvata tri podvrste- *Ralstonia syzygii* subsp. *syzygii*, *Ralstonia syzygii* subsp. *indonesiensis*, *Ralstonia syzygii* subsp. *celebesensis*. Utvrđeno je između 72 i 90% DNK srodnosti između filotipa I i III što ukazuje da oni predstavljaju jedinstvenu genovrstu. Tako *R. pseudosolanacearum* obuhvata sojeve *R. solanacearum* filotip I i III, *R. solanacearum* sojeve *R. solanacearum* filotip II, a *R. syzygii* sojeve *R. solanacearum* filotip IV.

Tabela 1. Prikaz promene u taksonomiji *R. solanacearum* (EPPO, 2017)

<i>Pseudomonas solanacearum</i> (prvobitno opisana kao <i>Bacterium solanacearum</i>)			
<i>Burkholderia solanacearum</i>			
<i>Ralstonia solanacearum</i>			
<i>Ralstonia solanacearum</i> kompleks vrsta			
Filotip I	Filotip II	Filotip III	Filotip IV
<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>	<i>Ralstonia solanacearum</i>	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>	<i>Ralstonia syzygii</i>

Rasprostranjenost i domaćini *R. pseudosolanacearum*. Rasprostranjena je u Africi (Demokratska Republika Kongo, Južnoafrička republika, Uganda), Americi (Brazil), Aziji (Kambodža, Kina, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Laos, Pakistan), Okeaniji (Nova Kaledonija). (slika 1) (EPPO, 2020). U Evropi je bila prisutna u Holandiji, međutim 2019. godine je zvanično proglašeno da je *R. pseudosolanacearum* uspešno eradikovana (EPPO, 2020a). Nalazi se na EPPO A2 karantinskoj listi (European and Mediterranean Plant Protection Organization), kao i na A1 listi (Aneks II A) u Evropskoj uniji. Neki od domaćina su, eukaliptus (*Eucalyptus urophylla*), sača inči (*Plukenetia volubilis*), ruža (*Rosa* spp.), muškatica (*Pelargonium*), paradajz (*Solanum lycopersicum*), plavi patližan (*Solanum melongena*), kurkuma (*Curcuma longa*) (EPPO 2018). *Ralstonia pseudosolanacearum*, kao i *Ralstonia solanacearum* obuhvataju značajan broj sojeva i daljim istraživanjima može doći do definisanja podvrsta, naročito kod *R. pseudosolanacearum* gde postoji jasna geografska podela sojeva koji pripadaju filotipu I i filotipu III (Safni, 2014). Iako se sojevi *R. solanacearum* proučavaju decenijama, trgovina biljnim materijalom širom sveta i brzo prilagođavanje ove bakterije, dovode do stalne pojave novih domaćina. Tako je nedavno *R. pseudosolanacearum* (filotip I, rasa 1, biovar 3) izolovana iz ukrasne ruže sa tipičnim simptomima bakterijske uvelosti (Tjou-Tam-Sin, 2017).

Slika 1. Karta rasprostranjenosti *R. pseudosolanacearum* (EPPO, 2020)

Osobine patogena i simptomi oboljenja. *Ralstonia pseudosolanacearum* (grč. *pseudes*- lažni, lažni *solanacearum*) spada u domen *Bacteria*, razdeo *Proteobacteria*, klasu *Betaproteobacteria*, red *Burkholderiales*, familiju *Burkholderiaceae* i rod *Ralstonia*. Bakterija je gram-negativna, asporogena, aerobna, a može biti pokretna ili nepokretna. Nakon 2 do 6 dana inkubacije na 28°C, na SMSA podlozi razvija tipičnu fluidnu, zamućenu, purpurnu bakterijsku koloniju, nepravilnog oblika, crvenkastu u sredini (Bergsma-Vlami, 2018). Bakterija je katalaza i oksidaza pozitivna, ne hidrolizuje skrob, eskulin ni želatin. Većina sojeva redukuje nitrata i koristi citrate, dok su nesposobni da koriste malonat. Testovi za fenilalanin deaminazu, ornitin dekarboksilazu, lizin dekarboksilazu i arginin dihidrolazu su negativni. Sojevi filotipa I i III se razlikuju od sojeva filotipa II i IV i po svojoj sposobnosti da koriste trehalozu (Safni, 2014). Biohemijsko-fiziološke karakteristike prikazane su u tabeli 2.

Simptomi koje ova bakterija prouzrokuje na ružama su uvelost mladih izdanaka i cvetnih stabala (slika 2a), praćeni žućenjem listova, kržljavošću, nekrozom orezanih grana i u nekim slučajevima pojavom beličastog eksudata na mestima orezivanja (slika 2b). Usled jake infekcije dolazi do nekroze stabljike i pojave braon boje u njenom donjem delu (slika 2c), odmah iznad zemlje (Bergsma-Vlami, 2018). Za detekciju i identifikaciju ovog patogena najrasprostranjenija je primena PCR metode (EPPO 2018).

Tabela 2. Biohemijsko-fiziološke karakteristike *R. pseudosolanacearum* (Safni, 2014)

	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>	
	<i>Ralstonia solanacearum</i> (filotip I)	<i>Ralstonia solanacearum</i> (filotip III)
Razvijanje na CPG podlozi	+	+
Hidroliza skroba	-	-
Proizvodnja kiseline iz laktoze	-	-
Proizvodnja kiseline iz maltoze	-	-
Proizvodnja kiseline iz fruktoze	+	+
Korišćenje trehaloze	+	+

+ pozitivna reakcija, – negativna reakcija

Prva pojava *R. pseudosolanacearum* na ružama. U avgustu 2015. godine, u Holandiji je uočena neuobičajena bolest na ružama (sorta Armando) uzgajanim u stakleniku. Mladi izdanci ruže su uvenuli, došlo je do žućenja i preranog odbacivanja lišća, zaostajanja u porastu, nekroze i pojave bele sluzi iz rezova na stabljikama. Nakon toga, još dva proizvođača reznica ruže su prijavila iste simptome na svojim biljkama. Izolovanjem patogena iz biljaka je, pomoću PCR metode i testa imuno-fluorescencije, utvrđeno da je reč o *R. solanacearum*, što je prvi dokumentovani izveštaj na svetu o pojavi *R. solanacearum* na *Rosa* spp. Daljim istraživanjima dokazano je da je u pitanju *R. pseudosolanacearum* (filotip I, rasa 1, biovar 3) (Tjou-Tam-Sin, 2016). Nakon što se *R. pseudosolanacearum* pojavila u Holandiji, njeno prisustvo je 2016. Godine uočeno u Švajcarskoj, međutim, primenom eradikativnih mera ova bakterija od 2018. godine više nije prisutna u toj zemlji (Ingyeong, 2020).

U julu 2017. godine u gradovima Paju i Tean, najvećim proizvođačima ruže u Južnoj Koreji, utvrđeno je prisustvo istog patogena na ružama, što je prvi slučaj pojave *R. solanacearum* filotip I na *Rosa* spp. u Koreji (Kim, 2019), a treći u svetu. Najverovatnije je da je *R. pseudosolanacearum* dospela u Koreju preko sadnog materijala iz Evrope, tačnije Holandije. Pojava bakteriozne uvelosti na ružama predstavlja ozbiljan problem za njene uzgajivače i distributere, te su naučnici i članovi Ministarstva poljoprivrede u Holandiji radili na tome da što pre identifikuju patogena i prouče njegove karakteristike (Ingyeong, 2020).

Slika 2. a) uvelost ruže, b) eksudat, c) nekroza u donjem delu stabljike (Bergsma-Vlami, 2018)

Istraživanje virulentnosti *R. pseudosolanacearum*. Tjou-Tam-Sin i saradnici su 2017. godine radili istraživanje sa ciljem procene virulentnosti izolata *R. pseudosolanacearum* na dva komercijalna kultivara ruže- Armando i Red Naomi (Tjou-Tam-Sin, 2017). Izolati PD 7123, PD 7195 i PD 7216 su izdvojeni iz prirodno zaraženih ruža iz staklenika, a izolat PD 1945 izdvojen je iz australijskog bora *Casuarina equisetifolia*. Potvrđeno je da svi izolati *R. pseudosolanacearum* pripadaju filotipu I, rasi 1, biovaru 3. U istraživanju je takođe procenjen uticaj drugih faktora kao što su temperatura i način inokulacije. Rađena su dva eksperimenta. U prvom je izvršena direktna inokulacija ruža pomoću igle, preko rana napravljenih skalpelom na stabljikama. Biljke su držane 42 dana na 24°C. U drugom eksperimentu izvršena je inokulacija ruža sa dva izolata *R. pseudosolanacearum* (PD 7123 i PD 7216), na dva načina: preko rana na stabljikama i preko zemljišta, tako što je

100 ml bakterijske suspenzije nasuto u zemljište u kom su posađene biljke. Biljke su 116 dana držane na temperaturi od 20°C i 28°C.

Rezultati istraživanja. Nakon 42 dana uočeno je da su oba kultivara ruže visoko osetljiva na izolate iz prirodno zaraženih ruža. Kultivar Armando ispoljio je prve simptome već 6-7 dana nakon inokulacije, a nakon 21 dana biljke su umirale, dok su se kod kultivara Red Naomi prvi simptomi pojavili u roku 11-15 dana od inokulacije, a biljke nisu umirale ni nakon 42 dana. Kod oba kultivara dokazano je prisustvo latentne infekcije na temperaturi od 24°C. Napredak bolesti i razvoj simptoma na ružama prikazan je na slici 3.

U drugom eksperimentu dokazane su značajne razlike u delovanju patogena pri različitim uslovima temperature, botaničke pripadnosti i načina inokulacije. Na temperaturi od 20°C nakon inokulacije preko povrede kultivar Armando je razvio simptome, ali nije došlo do smrti čak ni nakon 116 dana, a samo jedna biljka kultivara Red Naomi je pokazala blage simptome. Međutim, reizolati iz kultivara Red Naomi koji nisu ispoljavali simptome pokazali su da postoji visok stepen latentne infekcije, čak 60-70%.

Na 28°C, već 18 dana nakon inokulacije preko povrede uočena je smrt kod kultivara Armando, a kod kultivara Red Naomi nakon 43 dana, što pokazuje značajan efekat temperature na razvoj bolesti.

Pri inokulaciji preko zemljišta, kultivar Armando na temperaturi od 20°C nije razvio nikakve simptome, međutim na 28°C, intenzitet bolesti se povećao i većina biljaka je nakon 116 dana uginula. Sa druge strane, kultivar Red Naomi nije ispoljio simptome nakon ovog načina inokulacije, bez obzira na temperaturu. Utvrđeno je da kod ovog kultivara nije došlo ni do razvoja latentne infekcije, što pokazuje da je kod Red Naomi neophodna mehanička povreda kako bi došlo do razvoja bolesti na 20°C ili 28°C, a kod Armando na 20°C.

Uticaj različitih faktora na delovanje patogena. Uočena je značajna razlika u intenzitetu oboljenja na 20°C i 28°C. S obzirom da sojevi *R. pseudosolanacearum* (filotip I, rasa 1, biovar 3) zahtevaju relativno visoke temperature za razvoj simptoma (24-35°C), rezultati istraživanja koji pokazuju jak razvoj infekcije na 28°C, a slab ili umeren na 20°C su u skladu sa očekivanjima. Različiti načini inokulacije takođe su doveli do razlika u razvoju bolesti, pri čemu se inokulacija preko povređenog tkiva pokazala kao znatno efektivnija od inokulacije putem zemljišta, i to na obe temperature. Između izolata nije primećena razlika u virulentnosti bez obzira na temperaturu, način inokulacije i botaničku pripadnost. Uočene su značajne razlike u osetljivosti između ova dva kultivara, pri čemu je kultivar Armando znatno osetljiviji i ispoljava jači intenzitet i učestalost bolesti.

Slika 3. Razvoj simptoma na *Rosa* spp. prouzrokovanih *R. pseudosolanacearum*: (A) zdrava biljka- nema simptoma, (B) početni simptomi- prva pojava sumnjivih simptoma i bakterijske uvelosti, (C) tipični simptomi- obešeni listovi, nekroza koja polazi od rubova lista ka lisnim nervima, žutilo i prevremeno opadanje listova, nekroza stabljike, (D) potpuno uvenuće i smrt biljke (Tjou-Tam-Sin, 2017)

Širenje i mere suzbijanja. *R. pseudosolanacearum* je detektovana i u uzorcima vode iz sistema za navodnjavanje u stakleniku u kom su uzgajane ruže, što ukazuje na visok rizik od širenja patogena ovim putem. Kontaminirana voda i zaraženi biljni materijal su glavni načini širenja *R. pseudosolanacearum* (Bergsma-Vlami, 2018). Na drugim kulturama na kojima se javlja bakterijska uvelost, uspešno se pokazalo biološko suzbijanje korisnim mikroorganizmima, pre svega bakterijama. Bakterije *Pseudomonas brassicacearum* i *Pseudomonas fluorescens* pokazuju značajno inhibitorno delovanje na *R. pseudosolanacearum* u paradajzu (Subedi, 2019), a primena bakterije *Bacillus licheniformis* kao i CaCl_2 pokazala se kao dobra mera kontrole bakterijske uvelosti u đumbiru (Bhai, 2019). Laboratorijskim ispitivanjima je dokazano da materije biljnog porekla, hidroksikumarini (umbeliferon, eskuletin i dafnetin), pokazuju visoku antibakterijsku aktivnost i značajne su u borbi protiv bakterijske uvelosti duvana (Yang, 2018). *R. pseudosolanacearum* ima optimalne uslove u kojima razvija simptome na ružama, stoga treba razvijati i primenjivati metode kojima se izbegava

povređivanje biljke i stvaranje rana prilikom rezidbe. Razvoj rezistentnih sorti biljaka je najefektivniji način za kontrolu bakteriozne uvelosti. Međutim, selekcijski rad na stvaranju sorti otpornih na *R. solanacearum* je komplikovan, pre svega zbog heterogenosti populacije ovog patogena, te se pojavom novih rasa stvara velika mogućnost prevazilaženja rezistentnosti (Chesneau, 2018). S obzirom da je pojava latentne infekcije ruže pri napadu *R. pseudosolanacearum* moguća, njihovim razmnožavanjem i distribucijom širom sveta, uključujući i oblasti sa optimalnim klimatskim uslovima za razvoj ovog patogena, javlja se ogromna opasnost za čitavu cvečarsku industriju (Tjou-Tam-Sin, 2017). Stoga je najvažnije sprovoditi preventivne mere zaštite kojima se sprečava mogućnost pojave infekcije. To su pre svega proizvodnja zdravog sadnog materijala i biljni karantin kojim se sprečava unošenje zaraženog biljnog materijala i širenje zaraze unutar zemlje.

ZAKLJUČAK

Ralstonia pseudosolanacearum u povoljnim uslovima predstavlja veliku opasnost i nanosi značajne štete na ruži i drugim biljkama. Simptomi bakterijske uvelosti, pored smanjenja prinosa i kvaliteta, znatno narušavaju izgled svojih domaćina što je naročito značajno kod ruže kao ukrasne biljke. Brzo prilagođavanje i heterogenost populacije ove bakterije doprinose stalnom širenju i pronalaženju novih domaćina te su neophodne mere zaštite i stalna kontrola biljaka i biljnog materijala. Iako su do sada rađena mnoga istraživanja, potrebno je dalje ispitivati i proučavati karakteristike i epidemiologiju ove bakterije jer se na taj način stvara veća mogućnost pronalaska novih rešenja za njeno suzbijanje, sprečavanje širenja i oštećivanja osetljivih biljaka.

LITERATURA

- Balaž F., Balaž J., Tošić M., Stojšin V., Bagi F. (2010): Fitopatologija, bolesti ratarskih i povrtarskih kultura. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. 276-278.
- Bergsma-Vlami M., van de Bilt J. L. J., Tjou-Tam-Sin N. N. A., Westenberg M. (2018): Phylogenetic Assignment of *Ralstonia pseudosolanacearum* (*Ralstonia solanacearum* Phylotype I) Isolated from *Rosa* spp. APS publications. Plant Disease vol. 102, no. 11. 2258–2267.
- Bhai R., Prameela T. P., Vinchy K., Biju C. N., Srinivasan V., Nirmal Babu K. (2019): Soil solarization and amelioration with calcium chloride or *Bacillus licheniformis* - an effective integrated strategy for the management of bacterial wilt of ginger incited by *Ralstonia pseudosolanacearum*. European Journal of Plant Pathology. 154: 903-917.

- Chesneau T., Maignien G., Boyer C., Cheron J. J., Roux-Cuvelier M., Vanhuffel L., Poussier S., Prior P. (2018): Sequevar Diversity and Virulence of *Ralstonia solanacearum* Phylotype I on Mayotte Island (Indian Ocean). *Frontier in Plant Science* vol 8: Article 2209.
- EPPO (2017): Taxonomic revision of *Ralstonia solanacearum*. EPPO Reporting Service no. 10, Num article: 2017/194.
- EPPO (2018): PM 7/21 (2) *Ralstonia solanacearum*, *R. pseudosolanacearum* and *R. syzygii* (*Ralstonia solanacearum* species complex). EPPO Bulletin 48 (1). 32–63.
- EPPO (2020): *Ralstonia pseudosolanacearum* Distribution.
- EPPO (2020a): Eradication of *Ralstonia pseudosolanacearum* in the Netherlands.
- Forgić G. (2019): Zaštita ruža. AgroLekar.
- Ingyeong L., Yeong Son K., Jin-Won K., Duck Hwan P. (2020): Genetic and Pathogenic Characterization of Bacterial Wilt Pathogen, *Ralstonia pseudosolanacearum* (*Ralstonia solanacearum* Phylotype I), on Roses in Korea. *The Plant Pathology Journal*. 36(5): 440–449.
- Kereši T., Sekulić R., Popović A. (2016): Bolesti i štetočine u hortikulturi (deo- štetočine u hortikulturi). Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. 157-163.
- Kim Y. S., Lim S. R., Kim J. W., Lee H. J., Park D. H. (2019): First Report of *Ralstonia solanacearum* Phylotype I Causing Bacterial Wilt on *Rosa* spp. in Korea. APS publications. *Plant Disease* vol. 103, No. 6:1407.
- Yang L., Wu L., Yao X., Zhao S., Wang J., Li S., Ding W. (2018): Hydroxycoumarins: New, effective plant-derived compounds reduce *Ralstonia pseudosolanacearum* populations and control tobacco bacterial wilt. *Microbiological Research* vol. 215: 15-21.
- Safni I., Cleenwerck I., De Vos P., Fegan M., Sly L., Kappler U. (2014): Polyphasic taxonomic revision of the *Ralstonia solanacearum* species complex: proposal to emend the descriptions of *Ralstonia solanacearum* and *Ralstonia syzygii* and reclassify current *R. syzygii* strains as *Ralstonia syzygii* subsp. *syzygii* subsp nov., *R. solanacearum* phylotype IV strains as *Ralstonia syzygii* subsp. *indonesiensis* subsp. nov., banana blood disease bacterium strains as *Ralstonia syzygii* subsp. *celebesensis* subsp. nov. and *R. solanacearum* phylotype I and III strains as *Ralstonia pseudosolanacearum* sp. nov. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*. 64: 3087–3103.
- Solano G. (2020): Ecuador's blooming flower industry feels pandemic's punch. *The Washington Post*. The Americas.
- Subedi N., Taylor C., Pierce P., Miller S. (2019): Combining partial host resistance with bacterial biocontrol agents improves outcomes for tomatoes infected with *Ralstonia pseudosolanacearum*. *Crop protection* vol 135. Article 104776.
- Ševar J. (2016): Sadnja ruža – nega i zaštita ruža. Rasadnik Ševar.

- Tjou-Tam-Sin N. N. A., van de Bilt J. L. J., Westenberg M., Bergsma-Vlami M., Korpershoek H. J., Vermunt A. M. W., Meekes E. T. M., Teunissen H. A. S., Van Vaerenbergh J. (2016): First Report of Bacterial Wilt Caused by *Ralstonia solanacearum* in Ornamental *Rosa sp.* APS publications. Plant Disease vol. 101, No. 2: 378.
- Tjou-Tam-Sin N. N. A., van de Bilt J. L. J., Westenberg M., Gorkink-Smits P., Landman M., Bergsma-Vlami M. (2017): Assessing the Pathogenic Ability of *Ralstonia pseudosolanacearum* (*Ralstonia solanacearum* Phylotype I) from Ornamental *Rosa spp.* Plants. Frontier in Plant Science vol.8. Article 1895.

Abstract

Ralstonia pseudosolanacearum- PATHOGEN OF ROSE

Maja Đurić

University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia

E-mail: maja.djuric1997@gmail.com

Roses are one of the most significant ornamental plants in gardens and parks around the planet and its flowers are among the most recognizable in the world. Beauty of this plant can be endangered by attack of various pests and pathogens, such as plant pathogenic bacteria *Ralstonia pseudosolanacearum* (phylotype I, race 1, biovar 3). On roses it causes bacterial wilt, stunting, yellowing of leaves, and discharge of white oozes. It is on the EPPO A2 quarantine list and on the A1 list (Annex II A) in the European Union. It was first noticed on roses in the Netherlands, from where it spread to other countries. In the Republic of Serbia, presence of this bacterial disease has not been noticed on roses yet. However, due to possibility of developing a latent infections, there is a great risk of its spread by reproduction or trade in plant products. Therefore, it is necessary to implement preventive protection measures, such as production of healthy propagative plant material and plant quarantine. Creating bacterial wilt resistant plants is very hard because of heterogeneity of its population. There are various studies about *R. pseudosolanacearum* epidemiology on roses, however, the precise range of its hosts is still not investigated enough.

Key words: rose, *Ralstonia pseudosolanacearum*, plant pathogenetic bacteria