Emocionalno funkcionisanje dece i adolescenata sa celijačnom bolešću

Emotional functioning of children and adolescents with celiac disease

Biljana Stojanović-Jovanović¹, Stevan Jovanović¹,
Biljana Vuletić²

1. Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd
2. Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za pedijatriju, Kragujevac

Biljana Stojanovic-Jovanovic¹, Stevan Jovanovic¹,
Biljana Vuletic²

1. Academy of Applied Studies Belgrade, Department School of applied health Science Studies, Belgrade, Serbia
2. University of Kragujevac, Faculty of Medical Sciences, Department of Pediatrics, Kragujevac, Serbia

PRIMLJEN 13.04.2020.
PRIHVACEN 22.10.2020.

RECEIVED 13.04.2020.
ACCEPTED 22.10.2020..

APSTRAKT

Cilj. Utvrditi da li postoji prisustvo simptoma depresije, a samim tim i narušenost emocionalnog funkcionisanja dece sa celijačnom bolešću u odnosu na zdravu decu istog uzrasta.

Metode. Istraživanje je sprovedeno kao prospektivna, opservaciona studija. Ispitivanu grupu činilo je N 116 ispitanika (dece i adolescenata) uzrasne kategorije od 5-18 godina koji imaju dijagnozu celijačne bolesti. Kontrolnu grupu je činio isti broj zdrave dece koja su zadovoljila osnovne kriterijume „mečovanja“ sa ispitivanom grupom prema uzrastu i polu. Za procenu emocionalnog funkcionisanja i detekciju simptoma depresije korišćen je Upitnik o raspoloženju i osećanjima (Mood and Feelings Questionnaire Short - MFQ-Child).

Rezultati. Utvrđena je statistički značajno veća zastupljenost ispitanika kod kojih je prema graničnom skor, moguće prisustvo depresivnih simptoma u grupi ispitanika sa celijakijom ($p < 0,001$).

Zaključak. Kod dece i adolescenata sa postavljenom dijagnozom celijakije neophodno je imati u vidu psihološku dimenziju bolesti. Bezglutenska ishrana može stvoriti probleme u prihvatanju deteta od strane vršnjaka. Kod dece i adolescenata sa dijagnozom celijakije zbog neprijatnosti prouzrokovane drugačijim načinom ishrane u odnosu na vršnjake može se javiti i stanje psihološkog stresa. Prihvatanje bolesti i uspešno upravljanje dijetom bez glutena zahteva timski pristup.

Ključne reči: celijačna bolest; dete; adolescent; ishrana, bezglutenska; depresija.

ABSTRACT

Objective. determine if there are symptoms of depression and thus the impairment of the emotional functioning of children with celiac disease in relation to healthy children of the same age

Methods. The research was conducted as a prospective, observational study. The study group consisted of N 116 subjects (children and adolescents) aged 5-18 years who were diagnosed with celiac disease. The control group consisted of the same number of healthy children who met the basic criteria of "matching" with the examined group according to age and gender. To assess emotional functioning and detect symptoms of depression Mood and Feelings Questionnaire Short - MFQ-Child was used.

Results. In the group of children with celiac disease there is a statistically significant greater preference for depression ($p < 0.001$).

Conclusion. In children and adolescents with a diagnosis of celiac disease, it is necessary to keep in mind the psychological dimension of the disease. A gluten-free diet can create problems in the acceptance of a child by its peers. In children and adolescents with a diagnosis of celiac disease a state of psychological stress can also occur, mainly due to the discomfort caused by a different diet compared to their peers. Accepting the disease and successfully managing a gluten-free diet requires a team approach.

Key words: celiac disease; child; adolescent; diet, gluten-free; depression.

KORESPONDENCIJA / CORRESPONDENCE

Biljana Stojanović – Jovanović, Drinčićeva 11a /66, 11000 Beograd, Tel. 0691910884, E-mail: biljanastojanovic@gmail.com

Biljana Stojanović – Jovanović, Drinčićeva 11a /66, 11000 Belgrade, Serbia, Phone: +3816919 10 884, E-mail: biljanastojanovic@gmail.com

UVOD

Celijakija je sistemsko autoimuno oboljenje multifaktorske etiologije koje je genetski predisponirano a ispoljava se kada postoji izloženost glutenu.^{1,2} Pri ishrani koja sadrži gluten kod osoba sa celijačnom bolešću javljaju se upalni procesi u tankom crevu koji za posledicu imaju malapsorpciju neophodnih nutrijenata kao što su gvožđe, folna kiselina, kalcijum i vitamini rastvorljivi u mastima.^{3,4}

Zvanično jedini dokazani blagotvorni tretman za obolele od celijakije jeste bezglutenska dijeta.⁵⁻⁷ Bezglutenska ishrana, podrazumeva ishranu bez pšeničnog, raženog i ječmenog brašna i svih namirnica koje ga sadrže, sprovodi se doživotno i mora biti stroga, budući da i mali tragovi glutena u hrani mogu dovesti do oštećenja sluznice creva.^{8,9} Kada se iz ishrane eliminiše gluten u potpunosti moguća je kompletna reparacija sluznice creva a samim tim i neometana apsorpcija nutrijenata i normalizacija seroloških markera.¹⁰

Restrikcija u ishrani može biti teško prihvaćena od strane dece, posebno kada se otkrije tokom adolescencije, tada je i primećeno slabije poštovanje dijetetskog režima.¹⁰⁻¹³ Ograničen izbor hrane, može kod dece dovesti do socijalnih ograničenja, deca smanjuju nivo socijalnih kontakata sa vršnjacima, izbegavaju uzimanje hrane u društvu, otuđuju se, a to može uticati na kvalitet njihovog života.¹³ Emocionalne reakcije intenzivnog karaktera mogu se javiti kod dece i adolescenata sa celijakijom kao posledica pokušaja da se prevaziđu stresovi koji proističu iz same bolesti, lečenja i posledice lečenja.¹⁴ Problemi su više izraženi kod dece školskog uzrasta, a to je period u kojem je detetu važno da se ne razlikuje od druge dece.¹⁵

Sprovedena istraživanja ukazuju da se kod ove dece i adolescenata beleži i visoka incidenca depresije, tuge, osujećenosti, emotivne preosetljivosti, stidljivosti i razdražljivosti.^{16, 17}

Cilj rada je bio da se utvrdi da li postoji prisustvo simptoma depresije, a samim tim i narušenost emocionalnog funkcionisanja dece sa celijačnom bolešću u poređenju sa zdravom decom istog uzrasta.

ISPITANICI I METODE

Studija je realizovana kao prospektivno, opservaciono istraživanje. Ispitivanu grupu činilo je N 116 ispitanika (dece i adolescenata) uzrasta od 5-18 godina koji imaju dijagnozu celijakije. Kontrolnu grupu je činio isti broj zdrave dece koja su zadovoljila osnovne kriterijume „mečovanja“ sa ispitivanom grupom prema uzrastu i polu. Odabir ispitanika za kontrolnu grupu vršen je po metodi slučajnog uzorka iz osnovnog skupa dece koja pohađaju predškolski program, nastavu osnovne i srednje škole na teritoriji grada Beograda i nemaju dijagnostikovanu celijakiju.

Mesto istraživanja za ispitivanu grupu je Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ i Univerzitetska dečja klinika u Beogradu. Mesto istraživanja za kontrolnu grupu su Predškolske ustanove Vračar, u Beogradu, Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki“ - Batajnica u Beogradu i Srednja Zubotehnička škola Beograd u Beogradu. Kriterijumi za učešće u studiji su: životna dob dece, postavljena dijagnoza celijakije i bezglutenska ishrana najmanje godinu dana.

Opis korišćenog instrumenta: Upitnik o raspoloženju i osećanjima (Mood and Feelings Questionnaire Short - MFQ-Child) sadrži 33 pitanja. Odgovori su građuisani 0-1-2 („netačno“-„ponekad“-„tačno“), a zbir odgovora svih pitanja daje ukupni MFQ skor (raspon skora: 0-66). Veća vrednost skora znači veću verovatnoću da ispitanik ima depresivne simptome. Vrednost MFQ skora 27 i veća označava da su depresivni simptomi prisutni u klinički relevantnom opsegu. MFQ je psihometrijski pouzdan, validan, senzitivn upitnik i kulturološki adaptiran za srpski jezik.

Procedura testiranja: Upitnici su davani deci i adolescentima nakon pojašnjavanja, kako se upitnik popunjava bez obaveze da se potpišu na njemu. Vreme za popunjavanje upitnika nije bilo ograničeno. Pri anketiranju najmađih ispitanika učešće su uzimali i njihovi roditelji koji su deci usmeno postavljali pitanja iz upitnika što je bilo neophodno zbog poverenja koje dete ima u roditelje. Anketiranje je obavljeno pod supervizijom autora istraživanja, medicinske sestre, a za kontrolnu grupu psihologa ili pedagoga.

Etički aspekt: Istraživanje su razmotrili i odobrili Etički odbori Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, u Beogradu. Za učešće dece u studiji dobili smo njihovu pisanu saglasnost kao i pisanu saglasnost njihovih roditelja. U skladu sa etičkim zahtevima, ispitanici su upoznati sa svrhom istraživanja kao i da će se dobijeni rezultati koristiti za unapređenje kvaliteta života osoba sa celijakijom. Osim pomenutog, ispitanici su informisani da njihov identitet neće biti otkriven.

Podaci su analizirani i obrađeni iz pomoć standardnog paketa za statističku obradu podataka (Statistical Package for the Social Sciences – SPSSSTM for Windows, version 23.0, 2015). Dobijeni rezultati su prikazani tabelarno.

REZULTATI

Istraživanjem je obuhvaćeno 116 ispitanika, devojčica 77 (66.4 %) i 39 (33.6%) dečaka koji imaju dijagnozu celijačne bolesti, starosne dobi od 5 do 18 godina. Kontrolna grupa obuhvata 116 zdrave dece koja su zadovoljila osnovne kriterijume „mečovanja“ sa ispitivanom grupom prema uzrastu i polu. Za potrebe istraživanja, ispitanici su razvrstani u tri uzrasne grupe. Uzrasnu grupu od 5-7 godina čini 22 ispitanika i to 13 (59,09 %) devojčica i 9 (40, 91%) dečaka. Uzrasnu grupu od 8-12 godina čini 44 dece i to 29 (65,91%) devojčica 15(34,09%) dečaka i uzrasnu grupu od 13–18 godina čini ukupno 50 ispitanika, devojčica 35(70%) i 15(30%) dečaka. Nije potvrđeno da postoji statistička značajna razlika distribucije uzorka prema pripadnosti uzrasnoj grupi ($\chi^2 = 0,000$, $df = 2$, $p = 1,000$, $V = 0,000$) niti unutar pojedinih starosnih podgrupa ispitanika prema polu.

Statistički je značajno veća zastupljenost ispitanika kod kojih je prema graničnom skor, moguće prisustvo depresivnih simptoma u grupi ispitanika sa celijakijom nego u grupi zdravih ispitanika ($p < 0,001$) (Tabela 1).

Tabela 1. Distribucija i komparacija ispitanika sa celijakijom i zdravih ispitanika na MFQ.

Moguće prisustvo depresivnih simptoma (MFQ-Short)	Grupa 1		Grupa 2		p	V
	n	%	n	%		
Nije potvrđeno (< 27)	78	67,24	113	97,41	<0,001	-0,40
Prisutni (≥ 27)	38	32,76	3	2,59		

Grupa 1–Grupa ispitanika sa celijakijom (n=116);

Grupa 2–Grupa zdravih ispitanika (n = 116)

DISKUSIJA

U našem istraživanju je učestvovalo više devojčica nego dečaka, što objašnjavamo time da je celijačna bolest češća u ženskoj populaciji.¹⁸ Emocionalno funkcionisanje dece sa celijačnom bolešću je u vezi sa neophodnim specifičnostima u ishrani koja proističu iz ograničenja u odabiru namirnica i teškoća u nabavci bezglutenskih proizvoda.

Rezultati studije¹⁹ ukazuju da je kod dece i adolescenata sa celijakijom zabeležena visoka incidenca psiholoških problema. Najčeće zabeleženi psihološki problemi su: anksiozni poremećaji, simptomi depresije, osećanje straha, tuge, nizak nivo tolerancije na frustraciju, emotivna preosetljivost, stidljivost i razdražljivost. Deca i adolescenti sa ovom bolešću imaju i problem adaptacije na društveni život: smanjuju socijalne kontakte sa vršnjacima, izbegavaju konzumiranje hrane u društvu van svog doma, pa se na taj način socijalno i fizički distanciraju od okoline.¹⁹

U našoj studiji statistički je značajno veća zastupljenost ispitanika kod kojih je moguće prisustvo depresivnih simptoma u grupi ispitanika sa celijakijom u odnosu na grupu njihovih zdravih vršnjaka. U studiji Zarkadasa M. i saradnika najčešće negativne emocije koje su zabeležene kod dece na bezglutenskoj ishrani su frustracija i osećaj izolacije. Mnoga deca od momenta uvođenja restriktivne dijetе suočivši se sa psihološkim reakcijama su sklona nepoštovanju dijetе.²⁰

Socijalna anksioznost se definiše kao povlačenje, tužno raspoloženje, zabrinutost i /ili ispoljavanje ljutnje i besa, pa je neophodno detektovati decu sa ovakvim reakcijama a zatim im pružiti pomoć da prevaziđu ovakva osećanja i forme ponašanja. Bezglutenska ishrana zahteva radikalnu i doživotnu promenu u svakodnevnim navikama. Odmah nakon dijagnostikovanja celijačne bolesti važno je edukovati decu kako bi shvatila šta znači imati celijakiju i sprovesti bezglutensku ishranu i kako se može novi režim ishrane odraziti na njihov boravak u vrtiću ili školi.²⁰ Školski život i socijalni kontakti sa vršnjacima su neophodan činilac u adekvatnom razvoju dece. Adaptacija na školski život iz koga proističu obaveze i druženje sa vršnjacima je značajan pokazatelj funkcionisanja dece koji imaju hroničnu bolest i na specifičnom su režimu ishrane.

Kod posmatrane dece bila je prisutna zabrinutost zbog odsustva iz škole i odvajanja od vršnjaka. Zbog specifičnosti bolesti i stroge dijetе kao jedinog leka, deca i adolescenti ne pohađaju nastavu više nedelja i tako se lišavaju kontakata sa svojim školskim drugovima.²¹

Studija Casellas F. i saradnika je pokazala da doživotni striktni bezglutenski režim ishrane utiče na emocionalne i kognitivne aspekte ali i na mogućnost javljanja depresije.²² U studiji Hughes F. i saradnika istaknuta je visoka učestalost

depresije kod osoba sa celijakijom, kao i to da su pacijenti sa depresijom manje spremni da poštuju medicinske preporuke i poštuju režim bezglutenaske ishrane, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.²³ Povećana stopa depresije može biti povezana sa naglim promenama u životu, neke od njih bi mogle da budu restrikcija hrane tj. odabir samo proizvoda koji ne sadrže gluten, obavezno čitanje deklaracije pre kupovine namirnica, zatim isključivanje iz socijalnih i rekreativnih aktivnosti.²⁴

Addolorato G. sa saradnicima u svojoj studiji ističe da se kod 10% pacijenata sa celijakijom javljaju neurološki i psihijatrijski poremećaji. Kao razlog pojave anksioznosti i depresije kod obolelih od celijakije navode postojanje cerebralne hipoperfuzije u nekim regijama mozga koji mogu biti posledica nedostatka vitamina zbog malapsorpcije. Depresija na početku može biti prisutna kao posledica simptoma bolesti i malapsorpcije a u kasnijoj fazi bolesti zbog prehranbenih ograničenja. Smanjenje kvaliteta života ovih bolesnika je u vezi sa smanjenim osećajem opšteg blagostanja.²⁵

Depresija u dečjoj dobi se drugačije ispoljava u odnosu na depresiju kod odraslih jer je u vezi sa razvojnim činiocima te se može ispoljavati kroz anksioznost i somatske pokazatelje. Depresija kada se javi u dečjem uzrastu ima direktan uticaj na uspeh u skoli i socijalne relacije među decom istog uzrasta a može da dovede i do upotrebe narkotika i suicida, što pokazuju rezultati pojedinih studija.²⁶ Prema istraživanju Sarkhy A. i saradnika utvrđeno je da deca sa celijačnom bolešću imaju problem u vezi sa ishranom, posebno dok borave u školi zato što pojedini nastavnici i vršnjaci ne razumeju prirodu celijačne bolesti. Deca sa dijagnozom hronične bolesti imaju osećaj različitosti kao i povećanu potrebu za pažnjom i pomaganjem od strane bližnjih.²⁷

Chauhan JC. i saradnici su utvrdili da deca sa celijakijom češće izostavljaju aktivnosti u školi ali i kod kuće i često izbegavaju odlaske kod prijatelja i druženje sa vršnjacima.²⁸ Razlog takvog ponašanja može biti činjenica da što su deca sa problemom celijakije vrlo osetljiva, imaju potrebu da se osame, stide se svoje bolesti i često ne žele nikoga da opterećuju svojim potrebama za drugačijom hranom, posebno na zabavama i drugim društvenim događajima otkrili su u svom istraživanju Sverker i saradnici.^{26,29}

U istraživanjima koja se odnose na prisustvo depresivnih poremećaja kod dece i adolescenata uzrokovanih hroničnim bolestima, većina autora se saglasila sa činjenicom da je upotreba skala samoprocene depresivnih reakcija, uspešan način da se detektuju deca i adolescenti kojima je neophodno pružiti stručnu podršku u vezi sa nastalim poremećajem.²⁶

Škole i nastavno osoblje treba da sarađuju sa roditeljima

i da podrže decu sa ovim, a i drugim problemima. Znanje o celijakiji potrebno je da unaprede i nastavnici jer deca provode veliki deo dana u školama, pod njihovim nadzorom. Svetska literatura daje slične rezultate tj. pokazuje, da deci i adolescentima obolelim od celijakije nedostaje psihološka podrška u prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju.^{27,29}

U zaključku bezglutenska ishrana je potencijalni uzrok problema u prihvatanju deteta od strane vršnjaka. Evidentno je prisustvo simptoma depresije, a samim tim i narušenost emocionalnog funkcionisanja dece sa celijačnom bolešću u odnosu na zdrave vršnjake. Za prihvatanje bolesti i adekvatno sprovođenje bezglutenske dijeta potreban je timski pristup koji uključuje lekara, nutricionistu, medicinsku sestru, porodicu, dok se na centralnm mestu nalazi obolelo dete. Neophodni faktori za ponovno uključivanje deteta sa dijagnozom celijakije u školski život a samim tim njegovu socijalizaciju su psihološka podrška i pomoć od strane nastavnika kao i interesovanje vršnjaka iz škole.

LITERATURA

1. Radlović N. Celiac disease. *Srp Arh Celok Lek* 2013; 141: 122-6.
2. Troncone R, Auricchio S. Celiac disease. In: Wyllie R, Hyman JS, eds. *Pediatric gastrointestinal and liver disease*. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006: 517-27.
3. Kelly Cp, Feighery Cf, Gallagher Rb, Weir Dg. Diagnosis and treatment of gluten sensitive enteropathy. *Adv Intern Med* 1999; 35: 341-64.
4. Matek Z, Jungvirth-Hegeduš M, Kolaček S. Epidemiology of celiac disease in children in one Croatian county: the cumulative incidence over ten year period and way of clinical presentation (Part 1). *Coll Antopol* 1999; 23: 621- 8.
5. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. *Gastroenterology* 2001; 120: 636-51.
6. Pietzak Mm. Follow-up of patients with celiac disease: Achieving compliance with treatment. *Gastroenterology* 2005; 128: 135-41.
7. Williamson D, Marsh Mn. Celiac Disease. *Mol Biotechnol* 2002; 22: 293-9.
8. Sapone A, Bai JC, Ciacci C, et al. Spectrum of gluten-related disorders: consensus on new nomenclature and classification. *BMC Medicine* 2012; 10: 1-13.

9. Parada A, Araya M. History of gluten and its effects on celiac disease. *Rev Med Chile* 2010; 138: 1319-25.
10. Finkelstein FO, Wuerth D, Finkelstein SH. HRQOL and the CKD patient. *Kidney Int* 2009; 76: 946-52.
11. Biagetti Ch, Gesuitab R, Gattia S, Catassi C. Quality of life in children with celiac disease: A paediatric cross-sectional study. *Dig Liver Dis* 2015;47: 927-32.
12. Fabiani E, Taccari LM, Ratsch I.M, di Giuseppe S, Coppa G.V, Catassi C. Compliance with gluten-free diet in adolescents with screening-detected celiac disease: a 5-year follow-up study. *J Pediatr* 2000; 136: 841-43.
13. Nordyke K, Norström F, Lindholm L, Stenlund H, Rosén A, Ivarsson A. Health- related quality of life in adolescents with screening-detected celiac disease, before and one year after diagnosis and initiation of gluten-free diet, a prospective nested case-referent study. *BMC Public Health* 2013; 13: 142.
14. Spilker B, ed. Quality of life and pharmacoeconomics in clinical trials. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996.
15. Youssef NN, Murphy TG, Langseder AL, Rosh JR. Quality of life for children with functional abdominal pain: a comparison study of patients' and parents' perceptions. *Pediatrics* 2006; 117: 54-9.
16. Khurana B, Lomash IA, Khalil S, Bhattacharya M, Rajeshwari K. Evaluation of the impact of celiac disease and its dietary manipulation on children and their caregivers Indian *J Gastroenterol* 2015; 34: 112-6.
17. Rodríguez Gutiérrez AY. Psychological characterization of schoolchildren suffering from Celiac disease. *Rev Ciencias Médicas* 2013; 17: 102-11.
18. Kelly CP, Celiac Disease. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. *Sleisenger and Fordtran's: gastrointestinal and liver disease*. 10th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016: 1849-71.
19. Mazzone L, Reale L, Spina M, Guarniera M, Lionetti E, Martorana S, Mazzone D. Compliant gluten-free children with celiac disease: an evaluation of psychological distress, *BMC Pediatrics* 2011; 11: 46 .
20. Zarkadas M, Dubois S, MacIsaac K, et al. Living with celiac disease and a gluten-free diet: a Canadian perspective. *J Hum Nutr Diet* 2013; 26: 10-23.
21. Sainsbury K, Mullan B, Sharpe L. Reduced quality of life in coeliac disease is more strongly associated with depression than gastrointestinal symptoms. *J Psychosom Res* 2013; 75: 135-41.
22. Casellas F, Rodrigo-Saez L, Lucendo AJ, Fernandez-Benares F, Molina-Infante J, Vivas S. Benefit on health-related quality of life of adherence to gluten free diet in adult patients with celiac disease. *Rev Esp Enferm* 2015; 107: 196-201.
23. Hughes F, Stone K, Storey J. Perceived stress and comorbid illness predict depressive symptomatology in people with coeliac disease. *Aust Psychol* 2012; 27: 198-203.
24. Orfila C, Black J L. Impact of coeliac disease on dietary habits and quality of life. *J Hum Nutr Diet* 2011; 24: 582-87.
25. Addolorato G, Giuda DD, Rossi GD, et al. Regional cerebral hypoperfusion in patients with celiac disease. *Am J Med* 2004; 116: 312-17.
26. Sainsbury K, Mullan B, Sharpe L. Reduced quality of life in coeliac disease is more strongly associated with depression than gastrointestinal symptoms. *J Psychosom Res* 2013; 75: 135-41.
27. Sarkhy A, El Mouzan MI, Saeed E, et al. Socioeconomic impacts of gluten-free diet among saudi children with celiac disease. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr* 2016; 19: 162-67.
28. Chauhan JC, Kumar P, Dutta AK, Basu S, Kumar A. Assessment of dietary compliance to gluten-free diet and psychosocial problems in indian children with celiac disease. *Indian J Pediatr* 2010; 77: 649- 54.
29. Sverker A, Hensing G, Hallert C. Controlled by food: Lived experiences of coeliac disease. *J Hum Nutr Diet* 2005; 18: 171-80.